



سلسلة "إشرافات تربوية"  
الكتاب الثاني

المركز العربي للتعليم والتنمية

## النشاط الزائد لدى الأطفال (الأسباب وبرامج الخفض)

إعداد

دكتورة / مشيرة عبد الحميد أحمد البيوسفي  
أستاذ الصحة النفسية  
كلية التربية - جامعة المنيا

٢٠٠٥



**الإشراف العام**  
**الأستاذ الدكتور / ضياء الدين زاهر**

«إشرافات تربوية» هي سلسلة بحوث ودراسات علمية محكمة تصدر عن المركز العربي للتعليم والتنمية، وتمثل إضاءات جديدة في العلم التربوي الاجتماعي الحديث وتهدف إلى تأسيس خطاب جديد لثقافة تربوية جديدة تتسم في أن واحد بأنها نبت ثقافي عربي أصيل تعاونت في ريه وأحضانه عقول شباب الباحثين العرب فيسائر المجالات التربوية. وهي تسعى وبالتالي إلى توثيق الصلات العلمية والفكرية بين جميع الباحثين والمعنيين بالعمل التربوي ومفهومه الواسع.

وتتولى رسم المسارات الاستراتيجية العامة لهذه السلسلة هيئة تحرير رفيعة المستوى تضم نخبة متميزة من رواد الفكر في التخصصات العلمية كافة، ذات العلاقة الوثيق بال التربية في إطارها العام.

**هيئة التحرير \***

- |                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| أ.د إميل فهمي شنودة | أ.د أحمد زايد         |
| أ.د حسانين الكامل   | أ.د حامد عمار         |
| أ.د رافت رضوان      | أ.د حسينين ربيع       |
| أ.د عزت عبد الهادي  | أ.د محمد محمد الموجود |

---

\* مرتبة ترتيباً أبجدياً

# **إِنْدَاء**

**إِلَى الْوَالِدِينَ وَالْمُرْبِّينَ وَكُلِّ الْمُهَتَّمِينَ  
بِالنِّشَاطِ الْزَّائِدِ لِدُولِ الْأَطْفَالِ**

بسم الله الرحمن الرحيم

## تصديق د. ضياء الدبين زاهر

امتداداً للدور التنموي للمركز العربي للتعليم والتنمية ، واستمراراً للسلسلة العلمية التي يصدرها المركز بالتعاون مع الناشر نتقدم بهذه السلسلة الوليدة "إشرافات تربوية"- والتي تسعى في أهدافها الإستراتيجية- إلى تحقيق تنمية وعي سائر المهتمين بالتعليم بضرورة إحداث التغييرات الجذرية التي تفرضها المستجدات والتحديات -الداخلية والخارجية- على مستقبل التعليم في الأمة العربية، سواء في: أهداف التعليم وسياسته، و هيكله، وإدارته، و تخطيطه و تمويله، و اقتصادياته، و مناهج واستراتيجيات التعليم والتدرис -عامة كانت أو خاصة- و إعداد المعلمين، و الصحة النفسية لطلابه، و معلميه، وإداريه عامة، و تقويم العائد في كل منها بطريقة منتجة.

كما أن المعالجة المتوازنة الإجرائية لموضوعات السلسلة (التربية والسيكولوجية والاجتماعية والفلسفية)، وما تتسم به من موضوعية في التناول، تعاون، بدرجة كبيرة، في سد الفجوة بين التنظير التربوي والمارسات التعليمية في المجالات المختلفة؛ بصورة تكفل - في آن واحد - صيانة الهوية الثقافية للأمة، وتنمي في أبنائها -أفراداً وجماعات ومجتمعات - الفعالية العقلية، والكفاءة الاجتماعية، وتوظيف التقنيات العلمية والاجتماعية الحديثة في زيادة الإنتاج وتجويده في موقع الحياة كافية.

ولا تقتصر أهداف هذه السلسلة عند ذلك فقط، بل أنها تسعى جاهدة لاقتراح نماذج فكرية لتحديث الواقع الراهن في مجالات التعليم، يقترن كل منها بمتضمناته التربوية وتطبيقاته التعليمية ويراعي في تصميمها

وصياغتها يُسر قراءتها، واستيعابها من لدن أكثر الفئات المهنية بالتعليم: صانعوا القرار التعليمي-المعلمون والموجهون - الطلاب - أرباب الأسر - أجهزة الإعلام، ومؤسسات المجتمع المدني.

وميزة كتب هذه السلسلة كونها تنصب على موضوع محوري واحد، تتم معالجته من خلال شبكة من العلوم والمعارف والمعلومات البيئية التي ترقد الفكر التربوي والمارسات التعليمية والتعلمية (علوم اللغة، الانثربولوجيا التربوية، علم النفس المعرفي، اجتماعيات التربية، مستقبليات التربية واقتصادياتها ونحوها). لذا، يطيب لهيئة تحرير السلسلة أن تدعو من لديهم القدرة والإرادة إلى الإسهام في إصدار هذه الكتيبات فيسائر البلاد العربية أن يتفضلوا بموافقتنا بمقترناتهم.

وفي هذا الصدد، فإنه يسعدنا أن نتقدم بالكتاب الثاني في هذه السلسلة، وهذا الكتاب يتناول مشكلة سلوكية يعاني منها بعض الأطفال، وهي "النشاط الزائد" والتي تعد بحق مصدر ضيق وتوتر للمحيطين بالطفل، ويتناول مؤلفة الكتاب وهي أستاذة متميزة في مجالات الدراسات السيكولوجية. هذه المشكلة من خلال جزئيين، حيث يعد الجزء الأول مدخلاً مفاهيمياً لوصف وتصنيف ، وأسباب النشاط الزائد، ويتناول الجزء الثاني الاتجاهات الحديثة في برامج خفض النشاط الزائد لدى الأطفال حيث يقع هذا الجزء الثاني في أربعة فصول. يعالج الفصل الأول منها برامج النظام الغذائي حيث تنطلق المؤلفة من حقيقة وجود بعض الأطعمة لها أكبر الاثر في ظهور اضطراب النشاط الزائد، وكيف أن إتباع برنامج غذائي معين له فاعلية في خفض النشاط الزائد.

ويعالج الفصل الثاني برامج وأنظمة طبية يستخدمها الأطباء والمعالجون في الحد من فرط النشاط لدى الأطفال، واستعرضت المؤلفة في هذا الفصل أدبيات عالمية ومحليّة نظرية وتجريبية في هذا المجال.

ويعالج الفصل الثالث برامج تعديل السلوك للأطفال مفرطى النشاط، وقد استعرضت عديد من الأدبيات البحثية التي استخدمت وسائل متعددة من تعديل السلوك لدى الأطفال مفرطى النشاط.

في حين أن الفصلين الرابع والخامس فقد تناولاً برامج تعديل السلوك المعرفي، واقتصرت استراتيجيات متعددة للتدريب السلوكي المعرفي. أما الفصل السادس فيتناول برامج متعددة النماذج والاتجاهات.

وأملنا كبير في أن يحوز هذا الكتاب المتميز رضاء العديد من المهتمين بقضايا الطفولة وعلماء الصحة النفسية، لاسيما وأن المؤلفة لديها خبرة طويلة في التعامل مع الأطفال حيث تشغل وظيفة أستاذ الصحة النفسية بجامعة المنيا.

## مقدمة المؤلفة

إننا نستطيع الان بالعلم والإيمان عن طريق التعلم أن نجعل لحياتنا معنى وقيمة، وأن نحقق رسالة الخلود التي حاول أجدادنا في زمانهم أن يجسدوها في الأهرامات والمعابد .

ويسرني أن أقدم للقارئ العربي والمكتبة العربية هذا الكتاب المرجعي لأهم برامج خفض النشاط الزائد لدى الأطفال باكورة مجموعة المؤلفات حول سيكولوجية الطفل العربي .

ويتناول الكتاب بالعرض الشامل معظم الجوانب المتصلة بالمفاهيم الأساسية وأهم برامج خفض النشاط الزائد لدى الأطفال، والتي تهم أولياء الأمور والمربيين والمرشدين والخصائص النفسيين والاجتماعيين وغيرهم من المهتمين بنمو الطفل، والدارسين في дипломات الخاصة على مستوى الدراسات العليا، وتهم كل المتخصصين في وضع برامج إعداد المعلم المتخصص في هذا المجال .

وينقسم هذا الكتاب إلى جزأين :

**الجزء الأول :** يعتبر مدخلاً لموضوع النشاط الزائد لدى الأطفال .

**أولاً :** يشتمل على تطور مفهوم النشاط الزائد في الدليل التشخيصي للأخصائي للاضطرابات العقلية (DSM) والتعرifات المختلفة له سواء التعريفات الطيبة أم التعريفات السلوكية .

**ثانياً :** التصنيف الخاص باضطراب النشاط الزائد طبقاً للرقم المسجل في الدليل التشخيصي الرابع للاضطرابات العقلية والأعراض أو المظاهر السلوكية لكل نمط من أنماط التصنيف .

**ثالثاً :** أسباب هذا الاضطرابات سواء كانت أسباب وراثية أم أسباب بيئية أم أسباب اجتماعية .

## **الجزء الثاني :**

تناول أهم البرامج التي ساعدت في خفض النشاط الزائد لدى الأطفال، والدليل التشخيصي للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، ويشتمل أيضاً على عمليات التشخيص المبدئية والتعليمات الهامة لنجاح عملية التشخيص التي يجب أن تتوفر لدى الكلينيكي وينقسم إلى عدة فصول كالتالي :

**الفصل الأول :** يختص بأهم برامج النظام الغذائي، وما هو المسموح من الأطعمة، وما هو الممنوع منها، ومنها برامج خاصة بالحفظ على نسبة السكر في الدم ونظام غذائي عالي البروتين .

**الفصل الثاني :** يدور حول البرامج والأنظمة الطبية التي ساعدت في خفض مظاهر واضطراب النشاط الزائد .

**الفصل الثالث :** يدور الحديث فيه حول برامج تنظيم وتعديل السلوك للأطفال العاديين وغير العاديين، وفي نهاية هذا الفصل وضعت إرشادات عامة لبرنامج للتعلم الفردي لخفض النشاط الزائد، كما وضعت توصيات الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال باعتباره دليلاً أكثر فاعلية لخفض النشاط الزائد لدى الأطفال العاديين وغير العاديين .

**الفصل الرابع :** تناول عرضاً لبرامج تعديل السلوك المعرفي وهو ضروري لتعليم الأطفال ذوي النشاط الزائد كيفية التطبع بفاعلية واستقلالية مع المشكلات العقلية المعرفية ومواقف الحياة الاجتماعية والتخطيط المنظم والرعاية .

**الفصل الخامس :** خاص ببرامج تدريب الوالدين، وهي ضرورية لتدريبهما على كيفية تنظيم سلوك أطفالهم والفهم الكامل للطفل ذوي النشاط الزائد؛ حتى يكتشف بنفسه نماذج السلوك والطرق البديلة للسيطرة على انفعالاتهم، والعمل على اكتساب مهارات جديدة في أساليب العلاقات الأسرية

بهؤلاء الأطفال وفي الوقت نفسه تساعد الوالدين إلى خفض ضغوطهم النفسية من مظاهر النشاط الزائد لأطفالهم سواء العاديين أم غير العاديين .

الفصل السادس : يتضمن برامج متعددة النماذج حيث أسلوبات في تحسين المظاهر السلوكية للأطفال ذوي النشاط الزائد وتحسين انتباهم بنسبة ٨٣٪ وانخفاضت المظاهر السلوكية للنشاط الزائد بنسبة أعلى من ٩٠٪ لدى الأطفال في المدارس الابتدائية .

وفي نهاية الفصل تم عرض دليل الممارسات العملية لخفض النشاط الزائد لدى الأطفال والتي وضعتها الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال ويختتم الكتاب بتعليق على هذا البرامج .

وأخيراً وليس بآخر أتمنى من الله عز وجل أن ينال هذا المجهود المتواضع قبول القارئ (الدراس - ولي الأمر - المعلم)، ويكون بمثابة رسالة ينتفع بها بقدر ما ورد بها من معلومات تساعد في خدمة الأطفال أو من يقوم برعايتهم في الأسرة والمجتمع .

والله ولي التوفيق

الأستاذ الدكتور / مشيرة عبد الحميد البيوسفي

أستاذ الصحة النفسية

بكلية التربية - جامعة المنيا

## أولاً . فهرس الموضوعات

الصفحة	الموضوع
	<b>الجزء الأول : مفاهيم أساسية في النشاط الزائد</b>
١٤	المقدمة
١٥	أولاً — مفهوم النشاط الزائد
١٩	ثانياً — تصنيفات النشاط الزائد
٢٦	ثالثاً — أسباب النشاط الزائد
	<b>الجزء الثاني : الاتجاهات الحديثة في برنامج خفض النشاط الزائد لدى الأطفال</b>
٣٩	الفصل الأول : برامج النظام الغذائي
٤٦	الفصل الثاني : برامج وأنظمة طبية
٥٨	الفصل الثالث : برامج تنظيم وتعديل السلوك
٧٥	الفصل الرابع : برامج تعديل السلوك المعرفي
٨٩	الفصل الخامس : برامج تدريب الوالدين
١٠٩	الفصل السادس : برامج متعددة النماذج
١٢٩	خلاصة وتعليق
١٣٩	<b>قائمة المراجع</b>

## ثانياً . فهرس الجداول

الصفحة	الجدول
١٦	١ - جدول يوضح تطور مفهوم النشاط الزائد / قصور الانتباه كما وصفه Wong 1998
٤٤	٢ - جدول يوضح نظام غذائي عالي البروتين للحفاظ على نسبة السكر في الدم لدى الأطفال الذين يعانون من النشاط الزائد / قصور الانتباه
٥٦-٥٥	٣ - جدول يوضح نموذج لبرنامج طبي يستخدم لخفض مظاهر النشاط الزائد / قصور الانتباه (AAP2001)
٨٦	٤ - جدول يوضح الفنون العلاجية الأكثر تأثيراً في الأطفال ذوي النشاط الزائد / قصور الانتباه
١٢٩	٥ - جدول يوضح عدد البرامج والدراسات الحديثة في خفض النشاط الزائد / قصور الانتباه لدى الأطفال في كل اتجاه.

### ثالثا . فهرس الأشكال

الصفحة	الشكل
٣٨	١ - تخطيط لأهم الاتجاهات في برامج خفض النشاط الزائد لدى الأطفال .
١٢٦	٢ - شكل تخطيطي للدليل الكلينكي للممارسات العملية لخفض النشاط الزائد / قصور الانتباه لدى الأطفال للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP 2001)
١٣٧	٣ - تمثيل بياني لأعداد البرامج والدراسات في خفض النشاط الزائد / قصور الانتباه لدى الأطفال في كل اتجاه .

## **الجزء الأول**

### **مفاهيم أساسية في النشاط الزائد**

**مقدمة :**

**أولاً - مفهوم النشاط الزائد .**

**ثانياً - تصنيف النشاط الزائد .**

**ثالثاً - أسباب النشاط الزائد**

# الجزء الأول

## مفاهيم أساسية في النشاط الزائد

### مقدمة :

يعد النشاط الزائد Hyperactivity من المشكلات السلوكية التي يعاني منها الأطفال، ويشكل مصدراً أساسياً لضيق وتوتر وإزعاج المحيطين بالطفل ، حيث يعاني من هذا النشاط الزائد أولياء الأمور والمعلمون والتلاميذ، وما لا شك فيه أن سلوك هذا الطفل ومستوى نشاطه قد يؤثر على استجابات الوالدين والمعلمين والقائمين على رعاية الطفل، وعلى أسلوب معاملتهم للطفل ، مما يؤثر وبالتالي في نموه ومستقبله التعليمي والاجتماعي فيما بعد .

وحظيت مشكلة النشاط الزائد في السنوات الأخيرة باهتمام كثير من الباحثين في مجالات التربية وعلم النفس وطب الأطفال ، وأصبح أكثر الموضوعات شيوعاً في العصر الحالي ، حيث تناولت الكتب المؤلفة والأبحاث هذا الموضوع من زوايا متعددة .

فقد أشار بعض الباحثين إلى أنه اضطراب عضوي ، بينما أشار البعض الآخر على أنه اضطراب سلوكي . وتثير مشكلة النشاط الزائد الاهتمام لدى الباحثين والدارسين في المجالات الطبية، والنفسية ، والإرشاد الوالدي والتغذية . وسوف تجيب هذه الدراسة عن التساؤلات الآتية قبل التعرف على الاتجاهات الحديثة في برامج خفض النشاط الزائد وهي :

- ١ - ما مفهوم النشاط الزائد ؟
- ٢ - ما التصنيفات الحالية لهذا الاضطراب؟ وما مظاهر أو أعراض كل نمط من تصنفياته؟ ومتى تظهر هذه الأعراض أو المظاهر لدى الأطفال

- ٣ - ما أسباب حدوث هذا الاضطراب ؟
- ٤ - ما البرامج المختلفة لخوض مظاهر هذا الاضطراب ( النشاط الزائد ) ؟

### **أولاً - مفهوم النشاط الزائد :**

تطور مفهوم النشاط الزائد منذ عام ١٩٧٠ حيث كان يسمى " Hyperkinesias " وهي أصل الكلمة اللاتينية " Super active " وفي عام ١٩٨٠ سمي اضطراب قصور الانتباه Attention Deficit Disorder لأن النشاط الزائد في ذلك الوقت كان غير شائع ، وظل الأطفال الذين لديهم هذا الاضطراب يعانون من الاندفاعية مع قصور الانتباه، غير أن معظمهم يعانون من نشاط زائد . ( المعهد القومي للصحة النفسية . Notational )

( Keweley, 1998 )، Institution of Mental Health, 2000

ويوضح جدول رقم (١) تطور المفهوم في الدليل التشخيصي الإحصائي للأضطرابات العقلية Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder ( DSM )

## جدول رقم (١)

يوضح تطور مفهوم النشاط الزائد / قصور الانتباه كما وصفه

Wong, 1998

الدليل التشخيصي الرابع (DSM4 1994)	الدليل التشخيصي الثالث المعدل DSM111- R ) (1987)	الدليل التشخيصي الإحصائي الثالث (DSM111 1980)
<p>١ - نشاط زائد / قصور الانتباه مصحوب بتشتت انتباه ADHD وتعارفه ستة اعراض فقط في تشتبه الانتباه من قائمة بها تسعة اعراض .</p> <p>٢ - نشاط زائد / قصور الانتباه مصحوب باندفاعية ونشاط حركي زائد</p>	<p>اضطراب النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD ويعتبر على ثمانية اعراض في قائمة بها أربعة عشر عرضًا يدل على قصور الانتباه - الاندفاعية النشاط الزائد.</p>	<p>١ - اضطراب قصور الانتباه ADD بدون نشاط زائد وهو يحتوي على ثلاثة اعراض لقصور الانتباه ، وثلاثة اعراض للاندفاعية .</p> <p>٢ - قصور الانتباه واضطراب النشاط الزائد ويعتبر على ADDH عرضين للنشاط الزائد</p>
<p>ADHD وتعارفه ستة اعراض فقط من قائمة بها تسعة اعراض ، منها ستة اعراض تدل على النشاط الزائد ثلاثة اعراض تدل على الاندفاعية .</p> <p>٣ - نمط مشترك ADHD</p> <p>تعرفه الأعراض الذي ذكرت في رقم (١)، (٢) أعلاه .</p>		<p>الزائد .</p>

وسوف تستخدم الباحثة التسمية المختصرة (ADHD) أحياناً في الإشارة إلى اضطراب النشاط الزائد / قصور الانتباه .

وحاليا تم تغيير المفهوم رسميا واصبح اضطراب النشاط الزائد / قصور الانتباه \*Attention Deficit Hyperactivity disorder طبقا لتعريف الجمعية النفسية الأمريكية في الدليل التشخيصي الإحصائي الرابع للاضطرابات العقلية DSM 4 American Psychiatric Association (1994) وعلى الرغم من هذا التغيير إلا أن بعض المتخصصين ما زالوا يسمونه اضطراب قصور الانتباه Attention Deficit Disorder وقد حدث هذا التغيير في المصطلح نتيجة للتقدم العلمي والأبحاث والتجارب التي تمت في هذا المجال

### **التعريف الطبي للنشاط الزائد :**

يعرف الأطباء اضطراب النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD على أنه اضطراب جيني المصدر ينتقل بالوراثة في كثير من حالاته، وينتج عنه عدم توازن كيميائي أو عجز في الوصلات العصبية الموصولة بجزء من المخ والمسئولة عن الخواص الكيميائية التي تساعده على تنظيم السلوك ( Zametkin, et. al 1990 )

وتعرفه مجموعة متخصصة من الأطباء في قصور الانتباه والاضطرابات العقلية . Professional Group for Attention and PGARD, 1991 Related Disorder على أنه اضطراب عصبي حيوي يؤدي إلى عملية قصور حاد تؤثر على الأطفال بنسبة ٣ : ٥ % من تلاميذ المدارس .

بينما يعرفه شرنومازوفا Chernomozova 1996 على أنه نتيجة قصور في وظائف المخ التي يصعب قياسها بالاختبارات النفسية. وأخيرا يعرفه المعهد القومي للصحة النفسية National Institute of

(Mental Health, 2000) على انه اضطراب في المراكز العصبية التي تسبب مشاكل في وظائف المخ مثل : التفكير والتعلم والذاكرة . والسلوك

## **التعريف السلوكي**

عرفه باركلي (Barkley, 1990) في نظريته عن اضطراب النشاط الزائد / قصور الانتباه على أنه اضطراب في منع الاستجابة للوظائف التنفيذية قد يؤدي إلى قصور في تنظيم الذات ، وعجز في القدرة على تنظيم السلوك تجاه الأهداف الحاضرة والمستقبلة مع عدم ملائمة السلوك بينياً . بينما يعرف بргجن ( Breggin, 1991 ) الأطفال ذوي النشاط الزائد وقصور الانتباه على أنهم أطفال لم يحصلوا على اهتمام من الوالدين فحدث لهم هذا الاضطراب السلوكي.

وأشار الدليل التشخيصي الإحصائي الرابع للاضطرابات العقلية إلى ( DSM4 ) ( American Psychiatric Association 1994 ) أن اضطراب النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD يعني عدم قدره الطفل على الانتباه وقابليته للتشتت قد تؤثر على تركيزه أثناء قيامه بالنشاطات المختلفة وعدم إتمامها بنجاح .

بينما عرفه تشنومازوفا ( Chernomazova, 1996 ) على أنه اضطراب نتيجة النشاط الجركي البدني والنشاط العقلي للطفل ، عندما يكون في حالة هياج أو ثورة لانتصاره على أي شيء من نوع عنه ، وأكد جولد ستين ( Goldstein, 1999 ) تعريف باركلي في نظريته على أن الأطفال ذوي النشاط الزائد / قصور الانتباه الذين يعانون من مشاكل متعلقة بالوظيفة التنفيذية أثناء التعلم قد تكون السبب في إعاقة نموهم الأكاديمي وتجعلهم يعانون من صعوبة العمليات اللفظية المتصلة باللغة

وقد عرف اضطراب النشاط الزائد في كثير من الدراسات على أنه نوع من المشكلات السلوكية التي يعاني منها الأطفال العاديون وغير العاديين ، ولا تختلف مظاهره لدى الأطفال العاديين عن غير العاديين، ( Smith, et. al., 1995 ) بينما هناك رأي معارض في هذا التعريف حيث أن المظاهر السلوكية لدى الأطفال ذوي النشاط الزائد / قصور الانتباه العاديين تختلف عن غير العاديين ، وأن الأطفال المختلفين عقلياً لديهم صعوبة في اكتساب الخبرات والمهارات الأساسية وانخفاض مستوى الأداء للمهام المطلوبة سواء في المنزل أو المدرسة ، والقيام ببعض السلوكيات غير المقبولة اجتماعياً . غير أن المشكلات السلوكية التي تميز بها الأطفال المختلفون عقلياً تتسم بالعدوانية وعدم التعاون وعدم المشاركة في اللعب أو الأنشطة الأخرى بجانب حدة الحالة المزاجية. ( Koppekin, 1994 )، ( علاء عبد الباقى 1995 ) ، ( سعيد بن عبد الله والسيد السمادوني 1998 )، ( سعيد عبد العزيز محمود 2001 ).

## ثانياً - تصنیف اضطراب النشاط الزائد / قصور الانتباه

: ADHD

يعتبر الدليل التشخيصي الرابع للاضطرابات العقلية (DSM4) هو المرجع الذي يمدنا بتصنیف كامل للاضطرابات العقلية ، حيث يضع مجموعة من الأعراض يتطلب ظهورها لنجاح التشخيص ( American Psychiatric Association 1994 ) ، ( عبد الرحيم بخيت 1999 ).

ويوضح البحث فيما يلي التصنیف كما جاء في جدول المعايير التشخيصية لاضطراب النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD وطبقاً للرقم المسجل Code Based on Type بالمعايير التصنيفية للدليل

**التشخيص الرابع للاضطرابات العقلية** &Merrell, ) DSM4 :  
 كالآتي ( Mcnamara, 2000&Mcnamara,)، (٢٠٠١ Tymms,

١ - نمط اضطراب النشاط الزائد / قصور الانتباه والمصحوب بتشتت الانتباه  
**314-00 Attention Deficit/ HyPeractivity Disorder (ADHD) Predminantly Inattentive Type. A1**

٢ - نمط اضطراب النشاط الزائد / قصور الانتباه والمصحوب بالنشاط المفرط والاندفاعية  
**314.01 Attention Deficit / Hyperactivity Disorder(ADHD) Predominantly Hyperactive-Impulsive Type. A2**

٣ - نمط اضطراب النشاط الزائد/ قصور الانتباه (مشترك ( ١ ، ٢ )  
**314.01 Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder, combined Type A1 and A2**

ويذكر جولد ستين (Goldstein, 1999) أن هناك نمطاً رابعاً لم يتم تحديده بعد لعدم توافر أعراضه، ويذكر كيلي (Kewley, 1998) أن النمط المشترك لاضطراب النشاط الزائد/ قصور الانتباه ADHD Combined هو النمط الشامل والسائد لجميع أعراض النشاط الزائد.

**وفيما يلي وصف لأعراض كل نمط من الأنمط التصنيفية لاضطراب النشاط الزائد / قصور الانتباه طبقاً لمعايير DSM4 :**

أولاً : أعراض النمط الأول اضطراب النشاط الزائد / قصور الانتباه المصحوب بتشتت في الانتباه ADHD/ Inattentiveness Type :  
 وتظهر أعراضه بصفة مستمرة في آخر ستة أشهر قبل العلاج :

- ١ - الفشل في الانتباه الشديد للتفاصيل .
- ٢ - صعوبة في الاستماع عندما يتحدث إليه أحد .
- ٣ - صعوبة المتابعة من خلال التعليمات .

- ٤ - ضعف تنظيم المهام والأنشطة .
- ٥ - تجنب الجهود المدعمة وتجنب المهام التي تتطلب مجهود عضلي وعقلي .
- ٦ - سهولة السرحان في الأنشطة اليومية .
- ٧ - النسيان ( فقد أشياء ضرورية للمهام والأنشطة اليومية مثل اللعب والأقلام ) .
- ٨ - سهولة الانجذاب إلى مثيرات خارجية بعيدا عن المهام التي يقوم بها، أي يسهل تشتيت الفكر من خلال مثير خارجي .
- ٩ - فترة الانتباه قصيرة .

وطبقاً لمعايير 4 DSM يجب أن يظهر لدى الأطفال الذين يعانون من النشاط الزائد / قصور الانتباه ستة أعراض فقط من تسعه أعراض مميزة لهذا النمط، ويعتبر السلوك مطابقاً لمعايير DSM4 إذا تكرر على الأقل لمدة ستة أشهر قبل البدء في العلاج. وكان أكثر تكراراً مما هو عليه عند الأطفال الآخرين الذين لم يعانون من هذا الاضطراب .

( Leehey, 1994 & Merrel, 2001 ) ( Tymms, 2001 )

- ثانياً - أعراض النمط الثاني : اضطراب النشاط الزائد / قصور الانتباه المصحوب بالاندفاعية والنشاط الزائد المفرط ADHD /**
- : Impulsive Type&Hyperactive**
- ١ - القلق .
  - ٢ - التململ (اهتزاز الأرجل أو يرتك في الجلوس بخجل أو توتر عصبي)
  - ٣ - حركة مفرطة وعدم الراحة ويترك مكانه عندما يجلس فترة من الزمن
  - ٤ - ثرثرة في الحديث ( التحدث بتلقائية ) ويفضرون أصواتاً محدثين ضوضاء .

- ٥ - التصرف بدون تفكير ومقاطعة الآخرين ويجرى ويتسلق في أوقات غير مناسبة .
- ٦ - كثرة حركات الرأس والعينين ( يتحرك كأنه سائق سيارة أو بنشاط مندفع ) .
- ٧ - يتسرع في المواقف التي تتسم بعدم الوضوح .
- ٨ - غالباً ما يجد صعوبة في بداية المهام أو اللعب أو أنشطته وقت الفراغ
- ٩ - التسرع في إجابة الأسئلة قبل إتمامها ( يؤدون السلوك بدون تفكير فيه )

وطبقاً لمعايير DSM4 يجب أن يخضع الأطفال الذين يعانون من اضطراب ADHD لستة أعراض من تسعه أعراض مميزة لهذا النمط ويعتبر السلوك مطابقاً لمعايير DSM4 إذا تكرر على الأقل لمدة ستة أشهر قبل البدء في العلاج وكان أكثر تكراراً مما هو عليه عند الأطفال الآخرين الذين لم يعانون من هذا الاضطراب ( Leehey & Merrel, 1994 ) .

٥٥٥ ( Tymms 2001 )

ثالثاً : أعراض النمط المركب أو المشترك : اضطراب النشاط الزائد /

#### صور الانتباه المشترك ADHD Combined Type

ويشتمل على أعراض النمط الأول والنمط الثاني معاً وطبقاً لمعايير DSM4 يجب أن تظهر ستة أعراض من تسعه أعراض مميزة للنمط ، وتظهر هذه الأعراض قبل سن سبع سنوات ، وتعتبر الأعراض مطابقة للمعيار إذا تكررت على الأقل لمدة ستة أشهر قبل البدء في العلاج ، وكانت أكثر تكراراً مما هو عليه عند الأطفال الآخرين ( Leehey, 1994 ) ، ( Tymms, 2001 & Merrel, ) . ولم تعد كلام من الاندفاعية والنشاط المفرط وتشتت الانتباه خصائص منفصلة عن بعضها البعض ، ( Barkley, )

Minevich, &Druckman, )، ( Fabiano, 2001&Pelham )، (1990 . (2001

وأظهرت الدراسات العديد من الأعراض أو المظاهر السلوكية المميزة للنشاط الزائد عند الأطفال ، حيث وجدت أنهم لا يهتمون بمشاركة الآخرين في أفكارهم لشعورهم بعدم الثقة وعدم التشجيع ( Shoor, 1990 ) ، وأنهم يتسمون بالاندفاعية في تصرفاتهم وسرعة استجاباتهم دون تفكير مسبق، ولديهم حركة مفرطة ، كما أنه ليس لديهم القدرة على التركيز واستمرار الانتباه عند ممارسة أي عمل ( عفاف عبد المنعم ١٩٩١) وأنهم يعانون من صعوبات في التعلم والتركيز ( Halperin 1993 ) ولديهم سلوك اللامبالاة والتهور والحركة العشوائية الزائدة ( Selver 1992 ) ، (Leehey, 1994) وكثيراً ما يحطمون الأشياء ولا يحسنون معاملة زملائهم وغير متعاونين ، والتحدث بصورة مزعجة والتشویش على الآخرين ، وعدم الانتباه للمثيرات ذات الأهمية في المواقف التعليمية ( محمود عوض ، أحمد أحمد عواد ١٩٩٤ ) وعدم الاستقرار وعدم القدرة على الجلوس في مكان واحد وكثرة الحركة وعدم القدرة على إتمام أي عمل ( حامد زهران ١٩٩٨)، (أحمد مطر ١٩٩٢ ) .

وقد لاحظ الآباء والمعلمين هذه الأعراض أو المظاهر السلوكية التي كثرت الشكوى منها حيث اعتقد البعض أن بإمكانهم القيام بتشخيص هذا الاضطراب ومن هنا يتطلب الحذر في عملية التشخيص ( Breggin, 1999 ) وأكّدت الدراسات أن النمط المختلط هو النمط الذي يشتمل على هذه الأعراض جميعها . ( Barkely, 1990 )، ( Carlsom, et.al., 1995 )، ( Brito, et.al., 1995 ) وأن نسبة الأطفال ذوي اضطراب النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD حوالي ١٧,١ % في مقاطعة كولومبيا باليولايات المتحدة الأمريكية موزعين كالتالي :

- ١ - اضطراب النشاط الزائد / قصور الانتباه المصحوب بتشتت الانتباه نسبة شيوخ ٦٠,٧ %
- ٢ - اضطراب النشاط الزائد / قصور الانتباه المصحوب بالاندفاعية بنسبة شيوخ ١٠,٠ %
- ٣ - اضطراب النشاط الزائد / قصور الانتباه النوع المختلط أو المشترك من النمط الأول والثاني بنسبة شيوخ ٩,٤ % .  
وأن نسبة شيوخ اضطراب النشاط الزائد / وقصور الانتباه لدى أطفال ما قبل المدرسة حوالي ٦,٢ % أقل من نسبتهم في المدرسة الابتدائية من سن ٦ - ١١ سنه حيث وصلت النسبة إلى ٢٢,٦ % ( Pineda, et. al., 2001 )

وتؤكد الدراسات أيضاً أن ظهور أعراض النشاط الزائد / قصور الانتباه أكثر وضوحاً في الذكور عن الإناث وأن نسبة انتشاره بين أطفال مدارس الولايات المتحدة الأمريكية، بين ٣ - ٥ % من مجموع أطفال المدارس، ( Breggin, 1995&Breggin, 2001 ) وتشكل نسبة انتشار اضطراب النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD بين أطفال مصر إلى ما يقرب من ٦ % من مجموع الأطفال في المرحلة الابتدائية ( عبد العزيز الشخصي ١٩٨٥ ).  
لذلك سوف ترکز الباحثة في هذا البحث المرجعي على النمط المشترك أو المختلط لاضطراب النشاط الزائد / قصور الانتباه لدى الأطفال لأنه النمط الأكثر شيوعاً خلال مرحلة الطفولة والذي تصل نسبته إلى ٤ - NIH, ( American Academy of pediatrics, 2001 ) ، ، ١٢ %

( National Institute of Mental Health 2001

حيث أشار باركلي ( Barkley 1996 ) إلى نقطة هامة وهي عدم الوضوح التام فيما إذا كانت هذه الأعراض موجودة فعلاً في الطفل أم هي

مظاهر نمو سوف تتغير لدى الأطفال بتغيير مظاهر النمو في الكبر ، ووجد أيضاً أن نمط تشتت الانتباه مرتبط بصعوبات إتمام الواجبات المدرسية والاندفاعية ، وكلها مرتبطة باضطراب قصور الانتباه والنشاط الزائد **ADHD**

ثالثاً - أسباب اضطراب النشاط الزائد / قصور الانتباه : ADHD  
إن الأسباب الحقيقية لاضطراب النشاط الزائد / قصور الانتباه غير معروفة إلى الآن (Breggin, 1999، Mcnamara, &Mcnamara, 2000) ولكن شكل الاضطراب يهدى إليها . فيعتقد الأطباء أن السبب هو وجود مشكلات في انتقال نيورونات المخ قد تسبب انخفاض الطاقة التي في المنطقة العليا النشطة من المخ (الفص الأمامي) . ويعتقد البعض الآخر في عدم نضج الخلايا العصبية أو تأثيرها بالتلوث البيئي ، حيث كشفت بعض الدراسات الحديثة في عقد التسعينات عن العوامل المسببة لاضطراب النشاط الزائد / قصور الانتباه والذي ساعدت التكنولوجيا الحديثة في الكشف عنها ، وخاصة جهاز رسام موجات المخ Electri Encephalo Gram EEG وبعض أجهزة أشعة الرنين المغناطيسي وأجهزة الأشعة المقطعيه للمخ ( &Rositer, Lavaque 1995 ) .

واعتقد علماء الوراثة أن هذه الاضطرابات قد ترجع إلى عوامل نفسية بيولوجية ، حيث أن التكوين الوراثي للطفل وعوامل ما قبل الولادة - أثناء الولادة - بعد الولادة ، تؤكد وجود قاعدة أو أساس بيولوجي لهذه الاضطرابات ، غير أن السلوكيات المتصلة باضطراب ضعف الانتباه تتأثر أيضاً بالثقافة والبيئة ( Mcnamara, 2000&Mcnamara, 2000 ) .

وتتركز أسباب اضطراب النشاط الزائد / قصور الانتباه في الآتي :

### أولاً - الأسباب الوراثية :

اختلف العلماء في تحديد الأسباب الوراثية ، وظهرت ثلاثة اتجاهات

في ذلك هي :

الاتجاه الأول : يؤيد وجود أساس بيولوجي لاضطراب النشاط الزائد / قصور الانتباه ، حيث تؤكد الدراسات الحديثة أن سبب اضطراب النشاط الزائد / قصور الانتباه ينشأ من حدوث مشكلات وراثية بيولوجية . فبعض الدراسات ترجع الأسباب إلى :

١ - حدوث تلف في خلايا القشرة المخية ، وخاصة في النصف الكروي الأيسر ، والتي تتركز فيها مراكز التعلم ، واللغة ، والاتصال ، والذاكرة ، والانتباه ، والحركة ، والكلام والنشاط الحركي المرتبط بالعديد من تلك العمليات كحركة عضلات الوجه وأعضاء الكلام...الخ). (عثمان لبيب فراج ١٩٩٩، Armstrong 1991، Breggin, 1991). بينما أكدت دراسات أخرى أن سبب الاضطراب هو خلل وظيفي في العمليات الإدراكية الخاصة بالانتباه والتشتت ، والاندفاعية والحركة الزائدة ، وهذا قد يؤدي إلى تنوع أساليب العلاج 1990 (Kendall, 1990)، (Dupaul, et. al., 1992)، (Gorden, et.al.,1991)، (Leung, et. ) (Kaiser , 1993)، (al.,1994)

وأوضحت دراسات التوائم أن سبب الاضطراب يرجع إلى تأثير جيني وراثي يظهر بوضوح خلال التوائم المتماثلة ، أي إذا شخص أحدهما على أن لديه نشاط زائد يكون لدى الآخر نفس التشخيص ، وهذا يدل على تماثل الجينات الوراثية الخاصة باضطراب النشاط الزائد / قصور الانتباه ، أما التوائم غير المتماثلة فمعدلات التجانس تكون منخفضة (Kinsbourn 1990&Deutsch ) ووجد أن معدلات التجانس لدى التوائم

المتماثلة ٨١% بينما في التوائم غير المتماثلة وجدت النسبة ٢٩% (Gilger, et. al., 1992)

وهناك من يرى أن أسباب الاضطراب يرجع إلى عجز في المعايير المعرفية التي تتضمن التحكم المنعى وتغيير الاستجابة ، مما يؤدي إلى تأخر النمو في القراءة – وترجع أسباب الاضطرابات السلوكية الأخرى إلى تأثير البيئة (Goldstein ١٩٩٩).

والبعض الآخر أكد أن أسباب هذا الاضطراب يرجع إلى قصور في الناحية البيولوجية الداخلية ويمكن إعادة تشكيلها كاستجابات تكيفية في سياق بيئي (Jensen & Pfeffer, ١٩٩٧).

٢ - وجود زمرة توريت Tourettes syndroma وتنشأ هذه الزمرة من العجز الوظيفي في الجهاز العصبي الذي يتضمن غالباً أعراض النشاط الزائد / قصور الانتباه ، ولتشخيص هذه الزمرة يتطلب وجود لزمات حركية لفظية Motor and Vocal Tices : واللزمة هي عادة سريعة متكررة بانتظام سواء في الحركات العضلية أو الصوتية ، وأكثر هذه اللزمات شيوعاً هي إغماض العين – تعبيرات الوجه أو بعض الأصوات التي توصف بأنها احتقان واضح أو سعال يشبه النباح ، ويشار إلى هذه اللزمات على أنها لزمات بسيطة Simple Tics واللزمات المعقدة قد تضم أنواعاً أخرى مثل اللمس أو التقاط الأشياء من الأرض . وهذه الزمرة يمكن فهمها أفضل على أنها مجموعة تضم لزمات حركية ولفظية ( صوتية) وغالباً ما تكون ضمن أعراض اضطراب النشاط الزائد / قصور الانتباه . ويتوفر الدليل التشخيصي الإحصائي الرابع للاضطرابات العقلية DSM؛ معايير تشخيصية لزمرة توريتو (Leehey, 1994).

الاتجاه الثاني : يؤيد عدم وجود أساس بيولوجي لدى الأطفال ذوي النشاط الزائد / قصور الانتباه ويستبعد عامل الوراثة كعامل مسبب النشاط

الزائد له / قصور الانتباه ، حيث يفسر عثمان لبيب فراج ( ١٩٩٩ ) استبعاد تلف خلايا المخ كعامل مسبب للنشاط الزائد / قصور الانتباه ، لأن تلف المخ لا بد أن يؤدي إلى قصور معدل الذكاء ( تخلف عقلي ) مع أن نسبة عالية من يعانون من اضطراب النشاط الزائد / قصور الانتباه على معدل ذكاء عادي بل و منهم من هم على ذكاء مرتفع ، كما أن تلف خلايا المخ و وظائفه لا يمكن علاجه لأن خلايا الجهاز العصبي التالف لا تعوض إطلاقاً ، بينما أظهرت البحوث المسحية حالات من هؤلاء الأطفال قد تم علاجها وشفاؤها وهذا لا يمكن أن يحدث إذا كان العامل المسبب عضوياً ، وهو تلف في خلايا مراكز المخ ، فضلاً عن أن اضطراب النشاط الزائد / قصور الانتباه لم يمنع ظهور بعض المهارات والمواهب الفنية أو الأدبية أو العلمية أو الرياضية .

وأتفق في الرأي بالإجماع كل من المعاهد القومية في مؤتمر الصحة والنمو National Institutes of Health Consensus Development Conference 1998 ( والأكاديمية الأمريكية لأطباء الأطفال ) American Academy of Pediatrics 2000 بيلوجي لاضطراب النشاط الزائد / قصور الانتباه لدى الأطفال .

الاتجاه الثالث : يؤيد وجود عامل نفسي بجانب العامل الجيني لاضطراب النشاط الزائد / قصور الانتباه لدى الأطفال ، فنتائج الأبحاث لم تجزم بإثبات عامل الوراثة كعامل وحيد مسبب لهذا الاضطراب بل يوجد عامل سيكولوجي أو نفسي يعتبر أدلة ربط بين التأثير الجيني وسلوك النشاط الزائد / قصور الانتباه ( Kuntsi 2001 ) فأكملت دراسة بيكمام Pechham 2001 أنه يوجد أكثر من جين مسؤول عن الحالات الوراثية حيث وجد أن جين الدوبامين D<sub>4</sub> هو الذي ينظم مظاهر النشاط الزائد / قصور الانتباه وهو الشائع لدى الأطفال ويوجد جين آخر

يسمى دوبامين (Dopamin) (2D) ولا يوجد إلى الآن أي دراسة توضح الدور الذي يلعبه هذا الجين . بينما كشفت أبحاث جولدstein (Goldstein 1999) إلى وجود عوامل نفسية مؤثرة في هذا الاضطراب حيث أن النشاط المفرط عامة يصاحب اضطرابات نفسية أخرى.

### ثانياً - الأسباب البيئية :

تتعدد العوامل البيئية عند كل من فيرى فولر (Fowler, 1991) . (Leehey 1994) ، (عثمان فراج 1999)، (Bechham 2001)

١ - أن التسمم بالرصاص ربما يأتي نتيجة للأكل أو استخدام بعض اللعب، مما يؤدي إلى حالات شبيهة بأعراض اضطراب النشاط الزائد / قصور الانتباه كما أن حمض الأستيل سالسيлик والذي يوجد في تركيب بعض المواد التي تضاف إلى بعض الأطعمة لإعطائها نكهة أو لون صناعياً يؤدي إلى حالات مشابهة أيضاً. (عثمان فراج 1999) و(Fowler 1991)

٢ - التلوث البيئي خلال فترة الحمل أو في مراحل الطفولة المبكرة والتي يحدث فيها نمو المخ والجهاز العصبي

٣ - اضطراب الزيادة أو النقصان في إفرازات الغدة الدرقية .

٤ - الحساسية الزائدة لبعض الأغذية أو الروائح مثل: الأطعمة التي تشتمل على الألوان الصناعية

- ومحسنات الطعم اللبن - الشوكولاتة - البيض - الدقيق -  
الأسبرين - بعض الفواكه مثل الخوخ - البرتقال - التفاح - وبعض  
الخضروات مثل الفلفل - الطماطم - الحلويات والسكريات التي يتناولها  
الأطفال بكثرة (عثمان فراج 1999)، (Pechham, 2001)

٥ - بعض الأدوية والعقاقير وخاصة تلك التي تتناولها الأم أثناء فترة الحمل دون استشارة

- ٦ - تعرض الأم الحامل للأشعة مثل ( أشعة اكس ) بشكل زائد أو لعلاج كيميائي أو إشعاعي في حالة الإصابة بالسرطان.
- ٧ - إدمان الأم أثناء الحمل على التدخين أو الكحوليات أو المخدرات.
- ٨ - إصابة الأم الحامل بأحد الأعراض التي توقف تغذية الجنين بالأكسجين، مثل مرض السكر أو تعقد الحبل السري أو الولادة العسرة ( عثمان فراج ١٩٩٩ ).
- ٩ - يعتقد بعض الأشخاص أن مرض السكر في الدم يزيد من حالات النشاط الزائد لدى الأطفال ADHD والبحث العلمي . لم يظهر أي أثر لذلك، غير أن هناك شبه إجماع على أن اتباع برنامج للتنظيم الغذائي Diet قد يفيد في خفض النشاط الزائد الناتج عن ارتفاع نسبة السكر في الدم وتناول السكريات ( Leehey 1994 ) .
- ١٠ - حالات الخل الوظيفي للأذن الداخلية والعصب الدهليزي الموصل بينها وبين المخ Cerabell Vestibular . وقد يؤدي هذا الخل إلى إعاقة التعلم وفقدان التوازن ، وصعوبة في المشي على خط مستقيم واضطراب حركة العين أثناء القراءة أو رسم أشكال دقيقة ، واضطراب في إصدار أصوات الكلمات والجمل أثناء الكلام ، قد يؤدي إلى تعرّض أو صعوبة التأزر الحركي أو غير ذلك من الأعراض . وهذا يعتبر أحد اكتشاف في التسعينيات لاستخدام التكنولوجيا الطبية المستحدثة في فحص كل جزء من أجزاء المخ والأذن الداخلية ( عثمان فراج ١٩٩٩ ) .

### **ثالثاً - الأسباب الاجتماعية**

توصل باركلي ( Barkley, et. al., 1992) إلى أن اضطراب النشاط الزائد / قصور الانتباه ينشأ من أسلوب معاملة الوالدين للطفل ومدى التفاعل بينهما . حيث أنه أكثر عصيانا في كثير من المواقف للتوجيهات

و لا و امر التي سوجه اليه و كذلك بالنسبة للمدرس في المدرسه في الحركة  
الزائدة للطفل داخل غرفه الصف تسبب مشكلة للمعلم في الفصل الدراسي .  
و اشارت بعض الدراسات الى ان الفشل والإحباط وعدم  
التشجيع . و انخفاض احترام الذات والاكتئاب . قد يكون السبب في سلوك  
الاطفال ذوي النشاط الزائد قصور الانتباه ADHD أكثر من الاضطراب  
ذاته (Willcutt et.al., 1999، Landover 2001، National Mental ) .  
أكّدت دراسات عديدة في برامجها الإرشادية لوالدين - سوف يتم شرحها بالتفصيل فيما بعد - أن  
النشاط الزائد / قصور الانتباه يرتبط بجزء كبير بأسلوب معاملة الطفل  
من قبل الوالدين والمدرسين (Goldstein & Goldstein, 1998)

(Abbott, 1993، Gittelman, 1991، Shoor, 1990)

ويذكر بريو وآخرون (Prior, et.al., 1998) أن المستوى الاقتصادي الاجتماعي للأسرة يؤثر في ظهور المشكلات السلوكية بينما أثبتت دراسة بندوا وآخرون (Pineda et.al., 2001) أن أعراض النشاط الزائد / قصور الانتباه تكون واضحة بدرجة كبيرة في الطبقات ذات المستوى الاقتصادي الاجتماعي المنخفض والأسر المتصدعة لإهمال الوالدين للطفن وعدم رعايته.

ويعزى سبب ظهور أعراض النشاط الزائد / قصور الانتباه إلى  
النظام التعليمي ، و عدم توافر البرامج الخاصة بخفض النشاط الزائد  
و قصور الانتباه في المدارس حيث لا يتوفّر للأطفال الحصول على البرامج  
التربيوية الفردية التي يحتاجونها . وقد يؤدي بهؤلاء الأطفال إلى عدم تلقّي  
الرعاية الجماعية اللازمة في المدارس ، أو حتى العلاج المناسب لكي  
يتغلّبوا على هذه العوائق . (National Institute of Mental Health, 2001)

هذا بالإضافة إلى عدم توافر معلومات واصحه تلوالدين عن سمات هؤلاء الأطفال ذوى النشاط الزائد ، قصور الانتباه ADHD و عن كيفية التعامل معهم حتى لا يزيد الاباء من حدة صر عهم ويريد التصارب السلوكى ومشكلات عدم تقدير الذات (Leehevn 1994)

ويؤكد حامد زهران ( ١٩٨٠ ) أن اضطراب النشاط الزائد ليس مجرد تغيرات مصاحبة للنمو ، وأن الطفل قد يعاني من بعض المشكلات النفسية في حياته اليومية لا تصل الى درجة المرض النفسي ويجب الاهتمام بها قبل أن يستفحـل أمرها وتحول دون النمو السوي ويشير عبد الفتاح القرشى ( ١٩٩٣ ) إلى أنه يجب الاهتمام بها قبل أن يستفحـل أمرها وتحول دون النمو السوي ، وهذه التغيرات قد تكون انعكاساً لأساليب معاملة معينة أو أسلوب دفاعي ضد الشعور بالاكتئاب وقلة الحيلة.

وتؤكد بعض الدراسات أن العقاب البدني المتكرر للطفل ذي النشاط الزائد / قصور الانتباه يؤدي إلى نتائج عكسية ، فهناك بعض الآباء من يتبع أساليب خاطئة في تربية هؤلاء الأطفال ، مثل العقاب الجسدي وكثرة الأوامر والتعليمات ، مما يسبب إحباطاً لدى هؤلاء الأبناء ، وقد يلجأون إلى الأساليب السلوكية غير المرغوب فيها بسبب معاناتهم من الإحباط ( Goldstein 1999 & clark. 1990 & Heilveil. ) . وعلى العكس من ذلك فإن الأطفال ذوى النشاط الزائد / قصور الانتباه قد يسببون الإحباط والقلق لأبائهم وليس الآباء المحبطون أو القلقون هم الذين يسببون لأبنائهم هذا الاضطراب . ( Breggin. 1995 & Breggin )

ومما سبق ذكره نجد أن الأسباب كثيرة ومتعددة لحدوث هذا الاضطراب ( النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD ) مما يؤثر على إيجاد مفهوم محدد لهذا الاضطراب ، بل كل يعرفه طبقاً للأسباب التي يراها من

وجهة نظره ، وإلى الآن لا يوجد سبب محدد لهذا الاضطراب أجمعـت عليه  
الدراسات في هذا المجال .

حيث يعتقد البعض أن هناك عاملـاً وراثياً يتمثل في اختلافـات تشريح  
المخ والأعصاب والبعض الآخر ينفي ذلك ، بينما رأى ثالـث يؤكد ارتباط  
العامل الجيني (وراثي) مع العـامل النفـسي ، وإلى الآن لم تجزـم الـدراسـات  
بالـسبـبـ الحـقـيقـيـ الرـئـيـسـيـ وراءـ أـسـبـابـ اـضـطـرـابـ النـشـاطـ الزـائـدـ /ـ قـصـورـ  
الـانتـباـهـ .

## **الجزء الثاني**

**برامج ودراسات في خفض النشاط**

**الزائد لدى الأطفال**

**أولاً - برامج النظام الغذائي .**

**ثانياً - برامج وأنظمة طبيه .**

**ثالثاً - برامج تنظيم وتعديل السلوك .**

**رابعاً - برامج تعديل السلوك المعرفي .**

**خامساً - برامج تدريب الوالدين .**

**سادساً - برامج متعددة النماذج .**

## **الاتجاهات الحديثة في البرامج المختلفة لخض مظاهر**

### **النشاط الزائد لدى الأطفال**

#### **مقدمة :**

لقد تطورت حركة البحث في مجال النشاط الزائد لدى الطفل ، ولعل هذا يقود إلى الانتقال لجوهر هذا البحث المرجعي، وهو محاولة الكشف عن الاتجاهات الحديثة في برامج خفض النشاط الزائد لدى الأطفال . وقبل البدء في وصف البرامج المختلفة والتي تستخدم أساليب علاجية عديدة لخفض مظاهر النشاط الزائد يتطلب البدء بعمليه التشخيص الجيد للطفل من قبل مجموعة من المتخصصين الذين يفحصون جميع أوجه نمو الطفل وسلوكه ، ويعرف ذلك بالفريق متعدد النظم Multidisciplinary Team. ويكون هذا الفريق من طبيب بشري تخصص أعصاب ، وأخصائي نفسى، ومتخصص تربوى وأخصائى اجتماعى ، يعملون معاً للكشف عن سبب اضطراب الطفل . ( Mcnamara 2000&Mcnamara .

ونشرت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال American Academy of Pediatrics, 2001 أحدث دليل لتشخيص الأطفال ذوي النشاط الزائد / قصور الانتباه حيث يشتمل على عمليات التشخيص المبدئية كما يلى :

- ١ - الحصول على المعلومات الأساسية عن حالة الطفل من كل من يتعامل معه ( والديه - مدرسية - جيرانه أو القائمين على رعايته ) حيث يتم التعرف على سلوكياته .
- ٢ - التتبع اليومي من الأسرة لمعرفة وفهم الأعراض السلوكية لمدة ستة أشهر على الأقل قبل بدء العلاج .

٣ - التقييم المستمر للإجابات على أسئلة الأسرة مع اخذ البيانات الكافية عن تاريخ الأسرة والتاريخ المدرسي، وأسلوب التعامل مع الطفل في المنزل والمدرسة أو بعض المشاكل الخاصة بالطفل

٤ - وضع تصور لبرنامج تربوي مناسب لقدرات الطفل ADHD على التفكير ومهاراته الأكاديمية .

٥ - التنسيق مع المراكز الصحية ومؤسسات رعاية الطفل لعمل فحص طبي شامل على أجهزة السمع، البصر ، أو أي إعاقات في النمو ( مثل بعض المهارات الحركية، الذاكرة أو قدرة الطفل على التذكر ، وعن كيفية التحدث ) .

٦ - مساعدة الأسرة في وضع أهداف خاصة للمجالات التي يهتم بها الطفل ADHD ومعرفة مدى تأثيرها على أنشطته اليومية .

بالإضافة إلى ذلك محاولة زيادة الاتصال بين الأسر الأخرى ذوي الحالات المشابهة من الأطفال ADHD لتبادل المعلومات والاحتياجات الخاصة به ومعرفة مدى الاستفادة من أساليب التعامل المختلفة مع هؤلاء الأطفال . (American Academy of Pediatrics et. al. 1993& Perrin 1993)


ولنجاح عملية التشخيص يجب على الكيلينكي أن يتمهل في تشخيص هؤلاء الأطفال لأن مظاهر أو أعراض هذا الإضطراب قد تتشابه مع بعض مظاهر مشكلات سلوكية أخرى وخاصة في مرحلة ما قبل المدرسة (Willcutt, et. al., 1999)، (Weaver, 2000) حيث يتطلب ذلك الحذر في عمليات التشخيص وعدم التسرع في الحكم على الأطفال بأن لديهم اضطراب النشاط الزائد / قصور الانتباه (Breggin 1999) وخاصة في

مرحلة ما قبل المدرسة لتشابه المشكلات السلوكية في هذه المرحلة وهذا طبقا لاستنتاجات باركلي (Barkley. 1996) عن الخلط في عمليات التشخيص حيث ان حوالي ٣٥ - ٦ % من الأطفال ذو النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD في سن أقل من ٧ سنوات يشخصون على أنهم ذو اضطراب في السلوك المعارض (Oppositional Defiant Disorder ODD) وبعد فترة من النمو نجد حوالي ٣٠ - ٥٠ % يشخصون على أنهم ذو اضطراب في السلوك، وأحيانا نجد ١٥ - ٢٥ % يشخصوا على أن لديهم شخصية مضادة للمجتمع.

وهذا يوضح الخلط في عمليات التشخيص ما بين النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD ، اضطراب السلوك Conduct Disorder (CD) اضطراب السلوك المعارض (O.D.D). لدى هؤلاء الأطفال في المرحلة العمرية الأقل من ٧ سنوات مما يوضح صعوبة عمليات التشخيص في هذا السن .

وعقب إتمام عملية التشخيص يقوم المشخص بتحديد ما إذا كان الطفل لديه اضطراب في النشاط الزائد / قصور الانتباه أم لا وذلك باستخدام معايير الدليل التشخيصي الإحصائي الرابع لاضطرابات العقلية DSM4 والذي يعتبر معيارا هاما للتشخيص حيث يوضح الأعراض أو المظاهر السلوكية التي تظهر قبل سن ٧ سنوات والتي يجب أن تكون غير ملائمة لسن الطفل ومدى تكرارها لمده ستة أشهر على الأقل قبل البدء في العلاج، وعدم اشتراك هذه الأعراض أو المظاهر مع أي مظاهر سلوكيه أخرى أو عقلية مثل ( اضطراب القلق ، فصام الشخصية – أو اضطرابات عقلية أخرى ) .

و عملية التشخيص ليست سهلة مثل قراءة قائمة الأعراض، بل تحتاج إلى جهد متواصل وتعاون فريق من المتخصصين. وتدريب للاعبين والمدرسين، حيث أنه كلما زادت معرفة الأباء والمدرسين بهذا الطفل ADHD زادت مساعدتهم له وتحقيق النجاح في تخفيف هذه المظاهر ومن هنا يأتي دور البرامج الخاصة والتي تستخدم أساليب علاجية مختلفة لخفض المظاهر السلوكية للنشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD . وبما أن الدراسات لم تجزم بالسبب الحقيقي والرئيسي لمظاهر النشاط الزائد / قصور الانتباه ، ومن ثم فإن أساليب العلاج ما زالت تعطي بناء على أعراض النشاط الزائد وليس بناء على أسباب هذا الاضطراب . وفيما يلي تصنيف لاتجاهات الحديثة لدراسات استخدمت برامج وخطط علاجية فعالة في خفض النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD لدى الأطفال في التخطيط التالي :



شكل (١)

تخطيط لأهم الاتجاهات الحديثة لبرامج خفض النشاط الزائد لدى الأطفال

## الفصل الأول

### برامج النظام الغذائي

#### الفصل الأول برامج النظام الغذائي

ويؤكد أصحاب هذا الاتجاه على دور بعض الأطعمة المختلفة ومدى تأثيرها في ظهور اضطراب النشاط الزائد / قصور الانتباه لدى الأطفال ، وأن عمل نظام غذائي خاص ( أو رجيم خاص) لا يحتوى على هذه الأطعمة سوف يساعد في خفض مظاهر النشاط الزائد / قصور الانتباه لديهم . وفيما يلى عرض للبرامج الحديثة والدراسات التي استخدمت برامج النظام الغذائي المحدد في خفض النشاط الزائد لدى الأطفال :

هدفت دراسة كانكو و آخرون (Kaneko, et.al., 1993) إلى التعرف على أنواع الأطعمة التي تؤثر في ظهور اضطراب النشاط الزائد / قصور الانتباه لدى الأطفال وتحديداتها ، ثم عمل برنامج غذائي لخفض هذا النشاط الزائد لا يحتوى على هذه الأطعمة . وأجريت هذه الدراسة على عينة من (١٨٢) طفلاً يعانون من النشاط الزائد / وقصور الانتباه حيث اعتمدت على تقارير الوالدين في تحديد أنواع الأطعمة التي تؤثر في ظهور هذا الاضطراب وتوصل إلى أنواع الأطعمة الممنوعة وهي ( السكر - اللبن - الذرة - الشكولاتة - البيض - الدقيق - الألوان الصناعية المضافة للأطعمة الخاصة بالأطفال ومحسنات الطعام ) وبعد تحديد هذه الأنواع من الأطعمة قام بعمل برنامج أو نظام غذائي لا يحتوى على هذه الأطعمة بنسب محددة ولمدة خمس سنوات، ثم أجرى تقييم للمظاهر السلوكية للنشاط الزائد لدى هؤلاء الأطفال فوجد تأثير عالي لهذا البرنامج الغذائي في خفض المظاهر السلوكية للنشاط الزائد / قصور الانتباه لدى أطفال عينة الدراسة، ووضعت الدراسة توصيات باستشارة الطبيب المتخصص في

التغذية في وضع النظام الغذائي الخاص بهؤلاء الأطفال وخاصة الذين لديهم حساسية من بعض الأطعمة.

وتوصلت دراسة كيناكتشي وأخرون (Canacchi, et.al., 1993) إلى خفض مظاهر النشاط الزائد لدى الأطفال عن طريق برنامج غذائي معدل مضاد إليه بعض المعادن . لعينة مكونة من (١٤٩) طفلاً يعانون من اضطراب النشاط الزائد / قصور الانتباه وضعف في الذاكرة (النسوان) ، ضعف في الأداء المعرفي أو العقلي وعدم القدرة على التعلم. واستعانت الدراسة باختبارات الذكاء واختبارات التحصيل لقياس مستوى الذكاء والمستوى الأكاديمي لهؤلاء الأطفال . ثم تم تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبيتين الأولى ضابطة والثانية تجريبية حيث تم إخضاع المجموعة التجريبية لنظام غذائي محدد لا يحتوى على الأطعمة الممنوعة الساقية ذكرها مضافة إليها (٣٠٠ ملجم) من عنصر الفوسفاتيديل سيرين Phosphatidyl serine (PS)) يومياً . وبعد انتهاء التجربة أظهرت نتائج التحليلات الإحصائية تقدماً ملحوظاً في خفض المظاهر السلوكية للنشاط الزائد / قصور الانتباه لدى أطفال المجموعة التجريبية التي طبق عليها البرنامج الغذائي المحدد بالإضافة بعض المعادن ووجدوا أيضاً تحسناً في الذاكرة وفي الأداء التعليمي والمعرفي عن أطفال المجموعة الضابطة وأوصت الدراسة بقراءة التغذية بالإضافة بعض الفيتامينات والمعادن لنظام الغذائي المحدد لخفض النشاط الزائد لدى الأطفال .

وفي دراسة مماثلة أجراها لومبارد وجرمانو (& Lombard, Germano 1998) بغرض خفض المظاهر السلوكية للنشاط الزائد / قصور الانتباه عن طريق برنامج غذائي محدد وخاص لهؤلاء الأطفال . وتكونت عينه الدراسة من (١٦) طفلاً يعانون من النشاط الزائد / قصور الانتباه

واستعان بتقارير الوالدين في معرفة أنواع الأطعمة التي يتناولها هؤلاء الأطفال بكثرة ثم قام بعمل نظام غذائي محدد لهؤلاء الأطفال يحتوى على الأطعمة الآتية بنسب خفضها كالتالي :

السكر خفض بنسبة ٧٧٪ ، اللبن بنسبة ٣٨٪ ، الشكولاتة بنسبة ٢٨٪ ، الذرة بنسبة ٣٠٪ ، القمح الدقيق بنسبة ١٥٪ وبعد انتهاء عامين من تنفيذ البرنامج أظهرت النتائج أن حوالي ٦٢٪ من هؤلاء الأطفال تم خفض مظاهر النشاط الزائد / قصور الانتباه لديهم بذلك ثبتت فاعليه هذا البرنامج الغذائي ، وأوصت الدراسة بإضافة فيتامين (B) إلى أطعمة البرامج الغذائية المحددة حيث ثبت طبيا أنه مفيد لنمو خلايا المخ لهؤلاء الأطفال .

وأخيراً ظهرت أحدث برامج غذائية لخفض النشاط الزائد لدى الأطفال ومنها نموذج لبرنامج غذائي لكون ( Cowan, 2002 ) حيث أوصى باستخدام هذا البرنامج لكل عضو في الأسرة وليس فقط الأطفال ذوي النشاط الزائد / قصور الانتباه، حيث وضع هذا البرنامج عن طريق متخصصين، ويهدف إلى خفض مظاهر النشاط الزائد / قصور الانتباه لدى الأطفال ، ويعتبر من البرامج البديلة بعيدة عن استخدام الأدوية، والتي يفضل استخدامها أولاً قبل استخدام العلاج الطبي والعلاجات السلوكية المختلفة . ويحتوى البرنامج على الآتي :

#### **أولاً . الممنوعات من الأطعمة لمدة أسبوعين :**

١ - منتجات الألبان الطبيعية وبعض أنواع لبن الأطفال ذو الدسم .

ويستخدم البديل له ماء الأرض وشرب الماء بدلاً من اللبن بكمية كبيرة، لأنه يدخل في تركيب المخ بنسبة ٨٪ وإعطاء الطفل حوالي ٧ - ١٠ أكواب

ماء يومياً وليس من ضمنها المشروبات الغازية أو الشاي أو الأيس كريم أو العصائر .

٢ - أكل الأطعمة الصفراء مثل ( الذرة - القرع - الكوسة ) .

٣ - أكل الأطعمة المحفوظة لمدة طويلة Junk Foods .

٤ - شرب العصائر التي تحتوي على كمية كبيرة من السكر .

( كوب صغير من عصير التفاح به كمية من السكر تحتويها ٨ تفاحات وإذا أراد الطفل شرب بعض العصائر فيجب تخفيفها بالماء بنسبة ٥٠ % . )

٥ - يمنع أكل السكر بنسبة ٩٠ % ولو استطعت أن يكون صفر % يكون أفضل .

٦ - تخفيض الشكولاتة بنسبة ٩٠ % ويسمح بقطعة واحدة مره واحدة في الأسبوع، ولا تستخدم في حالات التعزيز للسلوكيات المرغوب فيها لدى الأطفال .

٧ - منوع الفطائر بأنواعها .

٨ - خفض الأطعمة المقلية بالزيوت الدسمة بنسبة ٩٠ % ويفضل الأطعمة التي تقلى بزيت الخضراوات Vegetable Oil .

٩ - تجنب الأطعمة الملونة بقدر الإمكان وخاصة إذا كان لدى الطفل حساسية ضد الأطعمة الملونة .

١٠ - تجنب الوجبات السريعة .

## **ثانياً . المسموم به من الأطعمة لمدة أسبوعين :**

يسمح باكل اللحوم بتنوعها بما فيها لحوم الرومي وكذلك الشوربة وتحتوى الوجبات اليومية على الكميات الآتية من العناصر الغذائية الهامة :

- ١ - في الإفطار كميات عالية من البروتين ويفضل استخدام البروتين البودرة ( مثل البيض البودرة ) لأنه يحتوى على بروتين عالي مع كمية قليلة من الكربوهيدرات أي حوالي ٦٠ % بروتين ، ٤٠ % نشويات أو كربوهيدرات وباقى الأطعمة بنسبة ٥٠ % إلى ٥٥ % ويسمح باستخدام اللبن الجاف على كوب من القهوة أو الشاي.
- ٢ - تقديم البروتينيات أيضا في وجبه الغذاء مع إضافة البروتينات البودرة إلى معظم الأطعمة لأنه مفيد جدا لهذا الطفل ADHD .
- ٣ - إضافه المعادن والفيتامينات ( في سلطه الخضراوات ) .
- ٤ - إعطاء بعض الفيتامينات الخاصة بالطفل .
- ٥ - استخدام زيت السمك [ فيتامين (أ) ] بإضافة ملعقة يومياً للسلطة أو استخدام زيت الخضراوات ] .
- ٦ - أكل أي كمية من الخضراوات والفاكهه .

وبعد أسبوعين يبدأ بإضافة أطعمة أخرى إلى هذا النظام الغذائي على كل وجبه يوم بعد يوم مع وضع الكمية المناسبة للنمو على قدر المستطاع ولمدة أربعة أيام . وهذه الأطعمة مقاديرها موجودة في كتاب طهي خاص بالنظام الغذائي الخاص وإذا حدثت أي مشكلة أو أي رد فعل لهذا النظام الغذائي سوف يظهر خلال الأربعة أيام الملحةة بنظام الرجيم السابق . وقد

ثبت فعالية هذا البرنامج في خفض النشاط الزائد / قصور الانتباه بنسبة ٢٠ % لدى الأطفال الذين استخدموه لهذا البرنامج

وفي برنامج آخر نشره المركز الطبي العام للتغذية (General Nutrition Center Clinic 2002) ويهدف هذا البرنامج الفعال إلى الحفاظ على نسبة السكر في الدم ما بين ٤٠ - ١٤٠ لدى الأطفال ذوي النشاط الزائد / قصور الانتباه بعد أن ثبتت فعاليته استخدامه لمدة خمس سنوات على هؤلاء الأطفال . ويشتمل هذا البرنامج الغذائي على نسبة عالية من البروتين مع الخضروات الطازجة، حيث وضع جدول يومي يحتوى على كمية من الأطعمة والسعرات الحرارية لكل نوع مع النسبة المئوية المفضلة يوميا .

#### جدول رقم (٢)

يوضح نظام غذائي عالي البروتين للحفاظ على نسبة السكر في الدم لدى الأطفال ذوي النشاط الزائد / قصور الانتباه

النسبة يوميا	(١) السعرات الحرارية لكل وجبة	النسبة يوميا	(٢) السعرات الحرارية لكل وجبة
%٤	حديد ٦٠ مليجرام	%١	١-كريوهيرك ٤ جرام
%٦	فوسفور ٥٠ مليجرام	%٤	٢-ليف وخضروات طازجة ١ جرام
%٦	ماغنيسيوم ٢٣ مليجرام	%-	٣-سكر صفر جرام
%١٥	صوديوم ٣٤٠ مليجرام	%٤٤	٤-بروتين ٢٢ جرام
%١٠	بوتاسيوم ٣٩٠ مليجرام	%٢	٥-كلسيوم ٢٠ مليجرام

و هذا البرنامج حق نتائج عالية في خفض النشاط الزائد / قصور الانتباه لدى الأطفال مع الحفاظ أيضا على نسبة السكر في الدم من ٤٠ —

. ١٤ .

و ظهرت برامج بديلة تستخدم الوخذ بالإبر الدقيقة لتوازن زيادة الطاقة خلال الجسم حيث أنها تركز على أماكن محددة بالجسم، يعتقد أنها بداية قتوات تفرغ الطاقة بصورة فردية وأثبتت الدراسات أن لها تأثيراً عالياً في خفض مظاهر النشاط الزائد / قصور الانتباه لدى الأطفال . ( Chermomazova, 1996)

### تحقيق

تعتبر برامج التغذية من البرامج البديلة عن استخدام الأدوية ، وهي برامج مفيدة وفعالة وتساعد بنسبة لا بأس بها في خفض المظاهر السلوكية والكلينيكية لدى الأطفال ذوي النشاط الزائد / قصور الانتباه، حيث أثبتت بعض البرامج فعاليتها بنسبة ٢٠٪ في خفض هذه المظاهر بينما برامج أخرى أثبتت فاعليتها بنسبة ٦٢٪ مع هؤلاء الأطفال، وذلك بتغيير النظام الغذائي لهم واستخدام النظام الغذائي المحدد في البرنامج. ومن الملاحظ أنه ليس هناك نظام محدد يساعد جميع الأطفال ذو النشاط الزائد / قصور الانتباه بصفة منتظمة ومستمرة ، غير أن النظام الغذائي المكثف يحتاج دائما إلى أخصائي تغذية جيد، حتى لا يفقد الطفل نضارته ويظهر في سن أكبر من سنه لو استخدم هذا النظام الغذائي لفترة طويلة .

## **الفصل الثاني**

### **برامج وأنظمة طبية**

وأصحاب هذا الاتجاه يعتقدون أن مظاهر أو أعراض النشاط الزائد / قصور الانتباه ينشأ من اضطراب في الوظائف السيكولوجية للجهاز العصبي المركزي، ومع وجود التكنولوجيا الحديثة يستطيع الباحثون في هذا المجال ملاحظة مناطق المخ النشطة أو الخامدة ومنها تحدد الأدوية المهدئة للمناطق النشطة والأدوية المنبهة أو المنشطة للمناطق الخامدة والمسئولة عن المظاهر السلوكية التي تميز اضطراب النشاط الزائد / قصور الانتباه لدى الأطفال، حيث ثبتت فعالية العلاج بالأدوية في خفض النشاط الزائد / قصور الانتباه لدى الأطفال . وتعودت الدراسات في الوسط الطبي لإثبات تأثير وفعالية العقاقير المستخدمة في خفض النشاط الزائد / قصور الانتباه لدى الأطفال. وسوف تعرض الباحثة بعضاً من هذه الدراسات وأهمها حيث أنها بعيدة عن مجال تخصص الباحثة ولكنها ضمن التداخلات التي تفيد في خفض النشاط الزائد لدى الأطفال .

في بداية التسعينيات قام هانت وزملاؤه (Hunt, et.al., 1990) بإجراء تجربة واسعة المدى، للتعرف على أنواع العقاقير التي تؤثر في خفض النشاط الزائد وسميت Open Trial حيث تم في هذه التجربة مسح شامل لعدد كبير من الأطفال الذين يعانون من اضطراب النشاط الزائد / قصور الانتباه والمصحوب بالإحباط وبعض مظاهر السلوك العدواني وذلك للتعرف على تأثير عقار " الكلونيدين " Clonidine وأيضاً عقار الجوان فاسين " Guan Facene " في خفض هذه المظاهر .

واستخدم الباحثون مقياس كونر لجمع المعلومات عن هذه الأطفال من تقارير الوالدين واظهرت التحليلات الإحصائية أن عقار الكلونيدين وعقار الجوار فاسين يعتبران من احسن العقاقير وأنجحها في خفض النشاط الزائد فصور الانتباه وخفض الإحباط وبعض السلوكيات العدوانية وذلك بإعطاء الجرعات بنظام ثابت طبقاً لكل طفل .

وفي دراسة حالة قام بها جادو وبوميري (Pomerey &Gadow ١٩٩٠) تتلخص في حالة طفله عمرها أربع سنوات تعاني من نشاط حركي زائد بدرجة شديدة مع تخلف عقلي متوسط الدرجة وقاما الباحثان بعلاجها بمركبات "المثيل فينيدات" Methylphenidate وعقار الفنفلورامين Fenfluramine وعقار بلاسبو Plasbo لمدة عامين ونصف بنظام الجرعات الثابتة وأظهرت النتائج انخفاضاً ملحوظاً في المظاهر клиينيكية والسلوكية للنشاط الزائد المفرط الحركة لدى الطفلة .

وهدفت دراسة جولدين (Golden ١٩٩١) إلى إثبات فعالية عقار الريتالين "Retaline" في خفض المظاهر السلوكية للنشاط الزائد / فصور الانتباه لدى الأطفال وذلك بنظام الجرعات الثابتة لدى (١٠) أطفال يعانون من النشاط الزائد / فصور الانتباه ، (١٠) أطفال آخرين من الأطفال العاديين وأعطى هؤلاء الأطفال جرعات بنظام ثابت من عقار "الريتالين" واعتمد على تقارير الوالدين في معرفة درجة تأثير العقار على عينه الدراسة . وأكدت النتائج أن عقار "الريتالين" يؤثر في كل من الأطفال الذين يعانون من اضطراب النشاط الزائد / فصور الانتباه والأطفال العاديين بنفس الدرجة والتأثير من ناحية المظاهر клиينيكية، وأشارت النتائج إلى أن سلوك الأطفال ذوي النشاط الزائد / فصور الانتباه ليس اضطراب سلوكي ولكنه هو مظهر من مظاهر الصراع .

وأجرى جادو دراسته (Gadow 1992) عن تأثير الأدوية المنبهة أو المنشطة في خفض النشاط الزائد / قصور الانتباه على عينة من أربعأطفال في سن المدرسة ويعانون من اضطراب النشاط الزائد / قصور الانتباه وبعض الاضطرابات العصبية على حركات غير طبيعية وحركات إرادية ( زملة توريت). واعتمد على تقارير الوالدين في جميع المعلومات عن حالة كل طفل وعن تاريخ حالة وزمن ظهور هذه الأعراض، وبدأ في نظام إعطاء الجرعات من مركبات الدكسي أمفيتامين Dexamphetamine لطفلين ومركبات المثيل فينيدات Methyphenidate لطفلين آخرين في جدول قسم إلى (٨) جلسات حيث بدأ بأقل الجرعات ثم استمر في زيادتها إلى أن حصل على أعلى درجة تحسن في المظاهر السلوكية للنشاط الزائد / قصور الانتباه وأيضا في الحركات العصبية الإرادية وغير العادية. وأكدت النتائج أن أحسن جرعة تعطي نتائج جيدة في خفض النشاط الزائد / قصور الانتباه في مركبات الدكسي أمفيتامين هي الجرعة التي تتراوح ما بين ١٥ و - ٥ مليجم لكل كيلو جرام يوميا . ومن مركبات المثيل فنيدات هي الجرعة التي تتراوح ما بين ٠,٣ - ١,٠٠ مليجرام لكل كيلو جرام يوميا ويمكن خفض الجرعات إلى النصف إذا حدث خفض للمظاهر السلوكية للنشاط الزائد / قصور الانتباه لدى الأطفال .

وتعرف تانوك واسكاتشر ( Schachar & Tannock 1992) على تأثير مركبات المثيل فينيدات (MPH) في خفض النشاط الزائد / قصور الانتباه لدى عينة من الأطفال عددهم (٢٦) طفلًا يعانون من اضطراب النشاط الزائد / قصور الانتباه حيث تم إعطاء مركبات المثيل فينيدات (MPH) وعقار بلاسيبو Placbo بنظام الجرعات في صورة متبادلّة واعتمد على تقارير الوالدين لمعرفة التغير الذي طرأ على سلوك الأطفال نتيجة تأثير العقار وأثبتت النتائج أن مركبات المثيل فينيدات من

## المحتمل أن نخفض بصورة مؤقتة مظاهر النشاط الزائد / قصور الانتباه لدى الأطفال

وتهدف دراسة سوانسون (Swanson, et.al., 1993) إلى التعرف على فعالية مركبات المثيل فينيدات ومنها عقار الريتاليين "Retalin" حيث أجرى تجربة على (١٩٦) طفلاً يعانون من اضطراب النشاط الزائد / قصور الانتباه تعاطوا عقار "الريتاليين" لعدة سنوات بنظام جرعات ثابتة ومتدرجة ومستمرة يومياً إلى أن يظهر تحسن في المظاهر السلوكية للنشاط الزائد وقصور الانتباه والاندفاعية. وأثبتت النتائج أن هذا العقار له تأثير إيجابي على احترام الذات وخفض المظاهر السلوكية للنشاط الزائد / قصور الانتباه وأيضاً له تأثير على خفض مظاهر السلوك العدواني والسلوكيات السلبية وخاصة في الأطفال ذوي الحالات المتأخرة من النشاط الزائد / قصور الانتباه وأظهرت النتائج أن الأطفال الذين عولجوا بعقار "الريتاليين" لفترات طويلة أدى ذلك إلى تحسن في مظاهر سلوكهم مع ظهور بعض الآثار الجانبية القليلة التي يمكن تحملها وتنتهي بطول فترة العلاج . ومن هذه الآثار الجانبية ( فقدان الشهية - الصداع - آلام في المعدة ) .

وأجرى إسفاكر وتانوك ( Tannock 1993&Schachar ) دراستهما بغرض إثبات مدى فعالية مركبات المثيل فينيدات ( Methylphenidate ) ((MPH)) في خفض المظاهر السلوكية للنشاط الزائد / قصور الانتباه لدى الأطفال حيث اختارا (١٨) تلميذاً من المدرسة الابتدائية يعانون من النشاط الزائد / قصور الانتباه وتم تقسيم العينة إلى مجموعة تجريبية عددها (٧) ومجموعة ضابطة عددها (١١) لم تتلقى أي علاج وتلميذ واحد فقط تلقى علاجه بمركبات الدكستروامفيتامين Dextroamphetamine أما المجموعة التجريبية فتلقت علاجاً بمركبات المثيل فينيدات (MPH) وعقار

بلاسبو Plasbo بنظام جرعات ثابتة في صوره متبادلة واعتمد على تقارير الوالدين في معرفة مظاهر التحسن في سلوك الأطفال . أظهرت النتائج تحسناً كبيراً في خفض المظاهر السلوكية للنشاط الزائد / قصور الانتباه لدى أطفال المجموعة التجريبية عن أطفال المجموعة الضابطة وأظهرت أيضاً أن الأدوية المنبهة مثل مرکبات المثيل فينيدات أظهرت تأثيراً أكبر من تأثير عقار بلاسبو Placebo في خفض مظاهر النشاط الزائد / قصور الانتباه .

وتهدف دراسة روزيترو لافاكي ( Lavaque 1995&Ressiter, ) إلى فحص فعالية التغذية الراجعة الحيوية بجهاز الأشعة المقطعيه للمخ Electro Encephalo Gram (EEG) والأدوية المنشطة في خفض النشاط الزائد / قصور الانتباه لدى الأطفال .

وتكونت عينة الدراسة من (٤٦) طفلاً يعانون من اضطراب النشاط الزائد / قصور الانتباه وتتراوح أعمارهم ما بين ٨ - ١٢ سنة، وقيسَت نسبة الذكاء ما بين ٨٠ - ١٢٠ . واستخدمت الدراسة اختبار متغيرات الانتباه في القياس القبلي والبعدي حيث صنفت العينة إلى مجموعتين تجريبيتين وتكونت كل مجموعة من (٢٣) طفل تلقت المجموعة التجريبية الأولى العلاج باستخدام الأدوية المنشطة النفسية ولم يتلقوا المعالجة الحيوية بالأشعة المقطعيه للمخ (EEG) . والمجموعة التجريبية الأخرى تلقت بدائل العلاج بالتغذية الراجعة الحيوية بالأشعة المقطعيه للمخ (EEG) .

وتحدد جدول معالجة من (٢٠) جلسة علاجية بواقع (٣) جلسات علاجية كل أسبوع مع تغير طرق المعالجة ولم تقتصر المعالجة على التغذية الراجعة الحيوية EEG والمنشطات النفسية فقط بل استخدمت طرق

إضافية تشمل على برامج تعديل السلوك بهدف تحسن سلوك الطفل في المدرسة وأرسلت استمرارات المستوى الأكاديمي والسلوكي إلى المنزل والمدرسة يومياً أو أسبوعياً .

وأظهرت النتائج أن أطفال المجموعتين التجريبيتين تم خفض مظاهر اضطراب النشاط الزائد / قصور الانتباه بالمعالجة بالأدوية المنشطة النفسية والتغذية الراجعة الحيوية (EEG) كما أظهرت النتائج أن المجموعة التجريبية التي تم علاجها بالتغذية الراجعة الحيوية (EEG) . أكثر فاعلية في خفض النشاط الزائد / قصور الانتباه عن المجموعة التجريبية الأخرى .

وتهدف دراسة جنسن وآخرون (Jensen, et. al., 1999) إلى خفض اضطراب النشاط الزائد/ قصور الانتباه لدى الأطفال عن طريق الأدوية وحدها. حيث تم إجراء التجربة على عينة من (٥٧٩) طفلاً يعانون من النشاط الزائد / قصور الانتباه في سن ٧ إلى ٩,٩ سنة وتم تقسيم العينة إلى أربعة مجموعات المجموعة الأولى عولجت بالأدوية فقط بانتظام لمدة (١٤) شهراً. والمجموعة الثانية عولجت بنظام دوري من العلاج الطبيعي الدوائي والعلاج السلوكي معاً والمجموعة الثالثة عولجت بالتقنيات السلوكي فقط والمجموعة الرابعة ضابطة لم تتنقى أي علاج.

وأظهرت النتائج انخفاض في المظاهر المزمنة لدى مجموعة الأطفال ADHD في سن المدرسة بعد أكثر من (١٤) شهراً من تقديم البرنامج الدوائي وحده. والمجموعة الأخرى التي تم تقديم برنامج مشترك في نظام دوري من العلاج الدوائي والعلاج السلوكي وجد أن ٨٥ % من هؤلاء الأطفال ADHD تم خفض المظاهر السلوكية للنشاط الزائد / قصور الانتباه بينما الأطفال الذين عولجوا بالنظام الدوائي فقط أو العلاج السلوكي

فقط لم يظهروا سلوكيات طبيعية تماماً مثل الأطفال الذين تم علاجهم ببرامج مشتركة من الأدوية والعلاج السلوكي معاً

وتشير دراسة انجرام وأخرون (Ingram. et.al 1999) إلى احسن جرعة دوائية تخفض أعراض النشاط الزائد / قصور الانتباه. حيث قام بتصميم جدول يتدرج فيه نظام الجرعات الدوائية المعطاة للطفل ذوي اضطراب النشاط الزائد / قصور الانتباه لعينة مكونة من (٥٠٠) طفل تم تقسيمهم إلى مجموعتين أحدهما تجريبية وأخرى ضابطة وتلقت المجموعة التجريبية نظاماً من الجرعات لأدوية آمنة (أي قليلة التأثيرات الجانبية) لمدة خمس أيام وتعطي الجرعات للطفل أثناء فترة المدرسة . ووضع جدول آخر من الجرعات الدوائية الآمنة لمدة سبعة أيام إذا كان الطفل في المنزل والمجموعة الضابطة لم تتلقى أي علاج . وأظهرت النتائج تحسناً ملحوظاً في المجموعة التجريبية حيث أكد أن أحسن جرعة دوائية هي التي لم يحدث عنها أي آثار جانبية مع تحسن واضح في خفض مظاهر سلوك النشاط الزائد / قصور الانتباه . ومن توصيات الدراسة أن تُخفض الجرعة الدوائية عندما تكون عالية ولها آثار جانبية إلى النصف وإذا لم يحدث تحسن في الحالة يمكن تغيير الجرعات الدوائية، وأكدوا أخيراً أن الأدوية المنشطة أو المنبهة عامة تعتبر أحسن الأدوية لتخفيض مظاهر النشاط الزائد وأكثرها أمناً لقلة التأثيرات الجانبية المصاحبة لها .

واستخدمت دراسة ويفر (Weaver 2000) نوعين مختلفين من الأدوية بنظام جرعات ثابت، والتي تساعد في خفض النشاط الزائد / قصور الانتباه [ADHD] لدى الأطفال على عينة مكونة من (٢٥) طفلاً ثم علاجهم بـ :

## ١ - الأدوية المنشطة Stimulants

### ٢ - الأدوية المضادة للاكتئاب Antidepressants

وأظهرت نتائج الدراسة الآتي :

- ١ - فعالية تأثير هذه الأدوية في تنظيم وخفض مظاهر النشاط الزائد / قصور الانتباه لدى الأطفال الأكبر سنا عن (٥) سنوات.
- ٢ - تحسناً في السلوك من خلال زيادة الانتباه .
- ٣ - تحسناً في زيادة التحكم في الاندفاعية .
- ٤ - خفض السلوك النشط الخاص بالمهام مثل السلوك الخاص بالجلوس داخل المنزل أو المطعم أو المدرسة .
- ٥ - يخفض من الضوضاء والسلوك المزعج . وأظهرت النتائج تحسناً كاملاً في المظاهر السلوكية والاضطراب النشاط الزائد / قصور الانتباه وذلك باشتراك هذين النوعين من الأدوية .

وقام إجباليه وأخرون (Eghbalieh, et.al.2000) بتصميم برنامج للمتابعة الطبية ، ويهدف هذا البرنامج إلى متابعة نتائج العلاج بالأدوية لدى الأطفال ذو النشاط الزائد / قصور الانتباه حيث أجريت تجربة على (٥٣) طفلاً من سن ٦ - ٧ سنوات يعانون من النشاط الزائد / قصور الانتباه . وقسمت العينة إلى ثلاثة مجموعات المجموعة الأولى (١٣) طفلاً تلقوا علاجاً بعقار الأمفيتامين "Amphetamine" والمجموعة الضابطة وعدها (١٧) طفلاً ولم تتلقى أي علاج بأي دواء والمجموعة الثالثة وعدها (٢٣) طفلاً تلقوا علاجاً متتابعاً من الأدوية مع علاج سلوكي . واستخدمت الدراسة نظام التنبيه (AS) ومقاييس الإنجاز والتحصيل (CPT, Continuous Performance Test) وتم تطبيق هذه الأدوات على المجموعتين التجريبيتين . وأوضحت النتائج أن المجموعتين التجريبيتين أظهرتا تحسناً في الأداء وتنفيذ المهام عن المجموعة الضابطة

غير أنها أظهرت تنوعاً في مرات رد الفعل والتي زادت في بعض المهام . ولم تظهر فروق بين المجموعتين التجريبتين في معدلات الإنجاز بشكل عام .

واستخدم لون (Loon,2000) نظاماً دوائياً خاصاً بعقار الكافيين " Couffen " ومركبات الأمفيتامين " Amphetamines " للتعرف على تأثيرهما على خفض النشاط الزائد / قصور الانتباه وعلى التحصيل المعرفي والإنجاز الحركي والعاطفي. وتم إجراء التجربة على عينة من الأطفال الذين يعانون من اضطراب النشاط الزائد / قصور الانتباه وعدهم (٢٠) طفلاً تم تقسيمهم إلى أربع مجموعات بكل منها خمسة أطفال. المجموعة الأولى تجريبية تلقت علاجاً بعقار " الكافيين " والمجموعة الثانية تجريبية تم علاجها بمركبات " الأمفيتامين " والمجموعة الثالثة تلقت العلاجين معاً عقار " الكافيين " مع مركبات " الأمفيتامين " والمجموعة الرابعة ضابطة لم تتلقى أي علاج . وأظهرت النتائج فاعليه مركبات " الأمفيتامين " أكثر من عقار " الكافيين " في خفض مظاهراً النشاط الزائد / قصور الانتباه والاندفاعية وتحسين الأداء الوظيفي أما نتائج المجموعة التجريبية التي تم فيها الجمع بين " الكافيين " " والأمفيتامينات " أعطت مستويات معتدلة في خفض مظاهر النشاط الزائد / قصور الانتباه عن المجموعات الأخرى .

وأكملت دراسة جلبرج وآخرون (Gillberg, et.al.2001) أن الأدوية المنشطة لفترة طويلة لدى الأطفال ذوى النشاط الزائد / قصور الانتباه (ADHD) تساعد في خفض مظاهره واشتملت الدراسة على عينة مكونة من (٦٢) طفلاً في سن ٦ - ١١ سنة تم تشخيصهم طبقاً لمعايير DSM4 تلقو علاجاً بعقار الأمفيتامين " Amphetamine " لمدة (١٥) شهراً .

وأظهرت النتائج مدى فاعلية هذا العقار في خفض المظاهر السلوكية للنشاط الزائد / قصور الانتباه لدى أطفال العينة وأن له تأثير إيجابي لمدته (١٥) شهراً بعد البدء من العلاج كما ظهر تحسن في نتائج اختبارات وكسيلر للذكاء عند هؤلاء الأطفال .

وفي دراسة تعتبر من أكبر الدراسات التي أجريت في المجال الطبي وهي دراسة تقويمية قامت بها الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال American Academy of Pediatric 2001 حيث جمعت الدراسات الطبية التي استخدمت الأدوية لعلاج اضطراب النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD لدى الأطفال واستنتجت نموذجاً لبرنامج طبي يستخدم لخفض النشاط الزائد / قصور الانتباه للأطفال كالآتي: ADHD

### جدول (٣) نموذج لبرنامج طبي يستخدم لخفض مظاهر

#### النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD

الإسم أو الفصل الدراسي	جدول الجرعات اليومية	التوقيت لمدى الجرعة	كمية الجرعة
الاختيار الطبي الأول الأدوية			
مثيل فنيدات Methyphenidate لفتره قصيرة ريتالين Retalin	مرتين في اليوم أو ثلاثة مرات في اليوم	٥ - ٣ ساعات	٢٠ - ٥ مليجم / كجم مرتين في اليوم إلى ٣ مرات في اليوم
لفتره متوسطه ريتالين Retalin مثيلين Methylin	مرة في اليوم إلى مرتين في اليوم	٨ - ٣ ساعات	٢٠ - ٤ مليجم / كجم مرة في اليوم أو ٤٠ مليجم / كجم في الصباح، ٢٠ مليجم بعد الظهر .
لفترة طويلة كونسرا متا ديت Concerta Metadate ريتلن Retalin	مرة في اليوم	١٢ - ٨ ساعة	١٨ - ٧٢ مليجم / كجم مرة في اليوم

### [تابع [ جدول (٣)

نموذج لبرنامج طبي يستخدم لخفض مظاهر النشاط الزائد / قصور الانتباه

(٢٠٠١) ADHD

الاسم أو الفصل الدراسي	جرحات لليومية	لوقت لدى لجرعة	كمية لجرعة
"Amphetamine" لفتره قصيرة "Dexedrine"	مرتين في اليوم في ثلث مرات في اليوم	٦٤ ساعت	١٥ .٥ ملجم/كجم مررتين في اليوم و ١٠ .٥ ملجم/كجم ٣ مرات في اليوم
لفتره متوسطة Adderal دكسدرین سبتوول	مره واحده إلى مررتين في اليوم	٨٦ ساعت	٣٠ .٥ ملجم/كجم مررة في اليوم ١٥ .٥ ملجم/كجم مررتين في اليوم
Adderal لفتره طويلة مضادات الاكتئاب الاختير الطبي الثاني في العلاج	مرة في اليوم		١٠ .٣ ملجم/كجم مررة في اليوم
ترائي سيكلوبيكis Tricyclics	مررتين في اليوم إلى ٣ مرات في اليوم		٥ .٥ ملجم/كجم يوميا
إيسبرامين،Desipramine Bupropion بوروبيش			
Wellbutrin وليوترین	مرة في اليوم إلى ٣ مرات في اليوم		١٠٠ .٥٠ ملجم/كجم ٣ مرات يوميا
Wellutrin (SR) وليوترین (س ر)	مررتين في اليوم		١٠٠ - ١٥٠ ملجم/كجم مررتين يوميا

### نتيجه

نستنتج مما سبق أن برامج العلاج الطبي ونظام الجرعات المختلفة لها تأثير إيجابي في خفض النشاط الزائد / قصور الانتباه لدى الأطفال، وأيضاً في زيادة احترام الذات، وأن الأطفال الذين تلقوا علاجاً بالأدوية المنشطة أو المنبهة لفترة طويلة أظهروا تحسناً كبيراً في السلوك . حيث أكد بي (Bee,1995) أن كثير من الأطفال الذين لديهم اضطراب النشاط الزائد / ويعالجون بالأدوية المنبهة مثل " الريتالين " أظهروا تحسناً، وتم

خفض المظاهر السلوكية اللاسوية وسلوكيات عدم الطاعة وتشتت الانتباه في الفصل، ولكن توجد آثار جانبية مثل ( عدم الاستقرار في النوم، ضعف الشهية للطعام ، آلام في المعدة ، صداع ، بعض أعراض توريزت ) تقليلاً إرادياً في العضلات وخاصة عضلات الوجه ) وبالتالي يلجأ الطبيب إلى تقليل дозы أو تغيير الجرعة الدوائية أو اللجوء إلى بدائل الأدوية لدى الحالات التي لم تستجيب للدواء ومن هنا يأتي الشك في نجاح العلاج بالأدوية المنشطة لمدة طويلة . غير أن بعض الدراسات أوصت بعدم استخدام الأدوية المنبهة وحدها بل لا بد من اشتراكها مع العلاج الشامل الذي يحتوى على العلاج الطبى والعلاج السلوكي معاً في المنزل والمدرسة وليس كل الأطفال الذين لديهم نشاط زائد / قصور انتباه يحتاجون إلى علاج طبى وقليل منهم لا يستجيب للعلاج بالمنبهات .

ويذكر (Fark, 1997) أن الأطفال الذين لديهم نشاط زائد / قصور انتباه وشخصوا مبكراً وتكيفوا مع الأسرة يفضل عدم إعطائهم علاج طبى خارج أوقات المدرسة ( أي في المنزل ) ويجب التركيز على المشكلات المدرسية وحلها بأساليب العلاج السلوكي.

## الفصل الثالث

### الفصل الثالث — برامج تنظيم وتعديل السلوك :

يعتقد أصحاب هذا الاتجاه أن المظاهر السلوكية لاضطراب النشاط الزائد / قصور الانتباه لدى الأطفال توجد بشكل أكثر حدة مما هو موجود عند الطفل الذي ينمو نمواً طبيعياً، ويمكن ملاحظة هذه المشكلات في أكثر من مكان، فقد يشكو الوالدان من هؤلاء الأطفال الذين لا يطِيعون الأوامر جيداً، أو يفهمون ما يفترض أن يقوموا به بعد تكرار التعليمات مراراً وتكراراً، مما يثير قلق الوالدين و يجعلهم أحياناً يستشِرُون الطبيب لعمل اختبارات فحص القدرة على الأبصار والاستماع حتى يتم التأكيد من أنه لا يوجد سبب عضوي أو طبي لظهور هذه الأعراض أو المظاهر السلوكية الغريبة .

وقد يشكو المدرسون أيضاً من السلوك المزعج والنشاط الحركي الزائد داخل الفصل الدراسي ، وهذا يجعلهم يستشِرُون أحياناً الأخصائي النفسي أو المرشدين لحل هذه المشكلات السلوكية حتى لا تؤثر هذه المظاهر السلوكية في نمو الطفل الأكاديمي والتكييفي مع زملائه في المدرسة . ويُتطلب ذلك اشتراك الوالدين مع المدرسين في علاج هذه المشكلات السلوكية حيث أنه من المعروف أن العلاج السلوكي يهدف إلى التحرر من أعراض السلوك اللاتواؤمي من خلال قمعه أو إبداله ( لويس مليكه ١٩٩٧ ) .

ويمثل ذلك أحد الخطوات الرئيسية لهذا الاتجاه حيث يشتمل على طرق أو فنِيات مختلفة لوضع برامج شاملة تهدف جميعها إلى تعديل السلوك وتنظيمه لدى الأطفال الذين يعانون من اضطراب النشاط الزائد / قصور

الانتباه، وفيما يلي عرض لبعض البرامج السلوكية والدراسات الحديثة في خفض مظاهر النشاط الزائد/ قصور الانتباه لدى الأطفال حيث تنقسم إلى محوريين :

أولاً : عرض لبعض البرامج السلوكية والدراسات الحديثة لخفض النشاط الزائد / قصور الانتباه لدى الأطفال العاديين .

أثبتت دراسة ارهارت وبيكر ( Baker, 1990&Erhardt, ) فعالية برنامج تدريبي سلوكي للوالدين والأسرة مع الطفل ذوي النشاط الزائد / قصور الانتباه وتم فحص طفلان ذكور في سن ٥,٢ - ٥,٨ سنة في مرحلة ما قبل المدرسة أحدهما فلبيني والثاني من الجنس الأسود، وقاما الباحثان بتطبيق برنامج تدريبي في تنظيم السلوك للطفل لمدة ( ١٠ ) أسابيع على ( ٢ ) جلسة بواقع جلستين كل أسبوع، وتم حضور الوالدين للعديد من جلسات المتابعة مع الطفل وسجل الوالدان قياسات السلوك الموجودة في قائمة السلوك الملحوظ بالبرنامج. وبعد تطبيق البرنامج وحضور الوالدين جميع الجلسات تم تقويم سلوك الأطفال ولوحظ تحسن في السلوك وحدث خفض لمظاهر اضطراب النشاط الزائد / قصور الانتباه وهذا التحسن نشاً من تحسن مفاهيم الوالدين عن علاقتهما بالطفل الذي يعاني من النشاط الزائد / قصور الانتباه وذلك من حضورهم للبرنامج التدريبي في تنظيم السلوك حيث أصبح لديهم الفهم الكامل والقدرة على تنظيم سلوك طفلهما . وأظهرت النتائج فعالية هذا البرنامج التدريبي في تنظيم السلوك وخفض المظاهر السلوكية للنشاط الزائد .

وفي دراسة تمهدية أجرتها باتياغو وآخرون ( Paniagua, et.al., 1990 ) عن تنظيم السلوك الفوضوي من خلال برنامج للتدريب على تصحيح الاستجابة Correspondence Training وذلك بهدف التعرف

على فعالية هذا البرنامج التدريبي في تنظيم السلوك الفوضوي المصاحب لاضطراب النشاط الزائد / قصور الانتباه لعينة من حالات كلينيكية لأطفال المدرسة الابتدائية من الذكور واستخدم الباحثون برنامجهم التدريبي لتنظيم السلوك الفوضوي من خلال تصحيح الاستجابات واستخدام اللعب ضمن أساليب التعزيز المختلفة للسلوك المرغوب فيه مع أساليب تعديل السلوك غير المرغوب فيه مثل ( ضعف الانتباه - النشاط الحركي الزائد - الاندفاعية - السلوك التخريبي ) . وقام الباحثون بعمل جلسات متعددة بتصميمات مختلفة وأثناء تطبيق البرنامج تم تسجيل السلوكيات غير المرغوب فيها وملحوظة درجة تحسنها ودرجة انخفاض حدتها لدى هؤلاء الأطفال . وأثبتت النتائج أن هذا البرنامج " التدريب على تصحيح الاستجابات لتنظيم السلوك الفوضوي " له تأثير مباشر على السلوك الفوضوي ، وجعله ينحو إلى السلوك الطبيعي ، أما التأثير غير المباشر فتمثل في تحسين الأداء الأكاديمي للطفل .

وتهدف دراسة بورنسين وكيفيلون ( Quevillon & Bornstein 1990 ) إلى معرفة مدى تأثير برنامج لتعديل السلوك باستخدام أسلوب التدريب الذاتي في خفض النشاط الزائد / قصور الانتباه . وتكونت العينة من ثلاثة أطفال يعانون من مظاهر النشاط الزائد / قصور الانتباه التي تتمثل في عدم اتباع التعليمات لفترة زمنية معقولة مع ظهور نوبات غضب عنيفة مع كثرة الحركة ، وعدم القدرة على التركيز والانتباه والتسرع في الرد أو الاندفاعية : واستخدم الباحثان أساليب العلاج المتمرکز على الطفل وأساليب النمذجة والتدريب الذاتي بهدف تعديل سلوك هؤلاء الأطفال في جلسات علاجية متعددة ولفتره محدده من الزمن وأثبتت النتائج فعالية برنامج تعديل سلوك الطفل ذوي اضطراب النشاط الزائد / قصور الانتباه وحدث انخفاض في المظاهر السلوكية لهذا الاضطراب وجاءت ADHD

نتائج الطفل الأول والثاني مويدة لارتفاع مستوى الأداء للسلوك. أما الطفل الثالث فلم يتحسن سلوكه بنفس درجة الطفلين الآخرين ويرجع ذلك إلى أسباب أخرى غير معلومة

واستخدم ولترسدورف (Woltersdorf 1992) برنامج النمذجة الذاتية باستخدام شريط الفيديو بغرض علاجي لخفض المظاهر السلوكية اللاتكيفية مثل (سلوك تشتت الانتباه – السلوك التخريبي – الألفاظ البذيئة) لدى الأطفال الذين يعانون من اضطراب النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD في المدرسة، واستخدم هذا البرنامج في رفع مستوى الأداء في مادة الرياضيات عند هؤلاء الأطفال ADHD . وتكونت عينة الدراسة من أربعة أطفال من الذكور يعانون من اضطراب النشاط الزائد / قصور الانتباه وسوء تكيف، وتراوحت أعمارهم ما بين ٩ – ١٠ سنوات وقام الباحث بتطبيق مقاييس تقدير المعلم ومقاييس الإنجاز لمعرفة مستوى الداء الأكاديمي في الرياضيات واستخدم برنامج النمذجة الذاتية عن طريق استخدام شرائط الفيديو وقام بعمل عدة جلسات مختلفة في العلاج. السلوكي لهؤلاء الأطفال كما استخدم برنامج لتدريب الوالدين على كيفية التعامل مع هؤلاء الأطفال بحضور الوالدين مع أطفالهم. وأظهرت النتائج ظهور تحسن وانخفاض واضح في المظاهر السلوكية اللاتكيفية لدى الأطفال ذوي النشاط الزائد / قصور الانتباه وظهر أيضا تحسنا في مستوى الأداء الأكاديمي في مادة الرياضيات .

وتهدف دراسة كاسير (Kaiser, 1992) إثبات مدى تأثير برنامج لتعديل السلوك داخل غرفة الصف على الوظائف الأكademie، واحترام الذات لدى الأطفال الذين يعانون من اضطراب النشاط الزائد / قصور الانتباه . وتم تطبيق البرنامج على ستة أطفال تتراوح أعمارهم ما بين ٨ – ١٣ سنة

حصلوا على ٩٨٪ من الدرجات في مقياس كونر للمدرسين في معدلات السلوك غير المرغوب فيه مثل ( سلوك التحدث بدون أذن - سلوكيات غير مألوفة - حركات كثيرة بدون هدف - سلوكيات عدم الطاعة ) وتلقى هؤلاء الأطفال البرنامج العلاجي لتنظيم هذه السلوكيات غير المرغوب فيها لمدة ( ١٠ ) أسابيع بواقع ( ٥،٣٠ ) ساعة يوميا حيث احتوى البرنامج على ست عمليات للتعرف على السلوكيات غير المرغوب فيها والتي تميز اضطراب النشاط الزائد / قصور الانتباه وهي :

- ١ - امكث في مقعدك ولا تتحرك . (سلوكيات تنفيذ الأوامر) .
- ٢ - لا تتكلم بدون أذن ( سلوكيات الطاعة / عدم الطاعة ) .
- ٣ - اكمل عملك ( سلوكيات إتمام المهام ) .
- ٤ - كن لطيفا مع الآخرين ( سلوكيات الإزعاج والتوتر ) .
- ٥ - حافظ على الآخرين (سلوكيات عدم المبالاة وعدم احترام الآخرين )
- ٦ - حافظ على ممتلكاتك الخاصة ( سلوكيات التخريب ) .

وبعد انتهاء ثلاثة أشهر من تطبيق البرنامج وتقديره، أظهرت النتائج فعالية هذا البرنامج في التعرف على السلوكيات غير المرغوب فيها وتعديلها إلى سلوكيات مرغوب فيها على قدر الإمكان . ومما يؤكد تأثير البرنامج في تعديل هذه السلوكيات غير المرغوبة حصلت أطفال المجموعة التجريبية على درجات عالية في معدلات السلوك السوي ، وأصبح لديهم القدرة على خفض السلوكيات غير المرغوب فيها عن طريق التعليمات المعطاة في البرنامج، وحصلوا أيضاً على معدلات عالية في المتطلبات الأكاديمية واحترام الذات حيث أظهرت العينة تقدماً أكاديمياً مع زيادة في احترام الذات.

واستخدمت دراسة كلف (Cluff, 1992) برنامج حركي باستخدام الألعاب البدنية بهدف التعرف على مدى فاعليه هذا البرنامج في تنظيم السلوك الانفعالي ومشاعر الغضب لدى الأطفال ذوي النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD حيث اشتملت عينه الدراسة على (٣٠) طفلا يعانون من اضطراب النشاط الزائد / قصور انتباه ولا يعانون من امراض أخرى (عصبية أو نفسية) ولا يستخدمون أي نوع من الأدوية المنشطة أو المهدئة . وتم تقسيم العينة إلى مجموعتين ، مجموعة ضابطة مكونة من (١٥) طفلا وأخرى تجريبية مكونة من (١٥) طفلا تلقوا برنامج عمل من خلال الألعاب البدنية بهدف خفض المظاهر السلوكية للأطفال ذوي النشاط الزائد / قصور الانتباه وتحدد زمن البرنامج طبقا لنوعية السلوك غير المرغوب فيه بحيث لا تزيد مدة عن (١٢) أسبوعاً بواقع ساعتين أو جلستين كل أسبوع وزمن كل جلسة (٣٠) دقيقة مع مراعاة الآتي :

- ١ - أن يتناسب البرنامج مع قدرات الأطفال وميولهم .
- ٢ - أن يراعي التدرج .
- ٣ - أن تتنوع الأنشطة المقدمة المختلفة من خلال خمسة أبعاد هي :
  - أ - تنمية اتجاهات إيجابية نحو الأسرة .
  - ب - أنشطة تحقيق النمو السوي .
  - ج - أنشطة لمساعدة الطفل على التنفس عن طافته .
  - د - أنشطة لمساعدة الطفل على ضبط الإيفاعات .
  - ه - أنشطة لتنمية شعور الطفل بالمسؤولية واحترام حقوق الغير .

وأظهرت النتائج فعالية برنامج العمل من خلال الألعاب البدنية في خفض السلوكيات التي يعتقد أنها السبب في اضطراب النشاط الزائد مثل سلوك الاندفاعية - السلوك الانفعالي الزائد - النشاط الحركي الزائد . وتفسر الدراسة سبب انخفاض حدة المظاهر السلوكية لدى الطفل ذوي

**النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD إلى شعور الطفل بالسعادة والرحة  
أثناء اللعب من خلال الأنشطة المقدمة في البرنامج**

واستخدم جوش وكاتوبديا ( Chattopadhyay 1993&Ghosh ) برنامجاً لتعديل السلوك مكون من أربع فنيات علاجية بهدف تعديل السلوك الناتج عن اضطراب النشاط الزائد لدى عينه من الأطفال مكونة من ( ١٥ ) طفلاً يعانون من اضطراب النشاط الزائد وقصور الانتباه في سن سبع سنوات وأنطبق عليهم شروط ، DSM لمظاهر اضطراب النشاط الزائد / قصور الانتباه ولم تتحقق العينة أي علاج دوائي وطبق على العينة برنامج لتعديل سلوك النشاط الزائد / قصور الانتباه ولتحسين الكفاءة التعليمية بتعديل السلوك الذي يركز على إتمام المهام ، والسلوك التعاوني والسلوك الاجتماعي واستخدمت الدراسة في برنامجها :

١ - أسلوب التعزيز الإيجابي .

٢ - بعض برامج التعلم .

٣ - مبادئ بريماك Premack's Principle

٤ - تكلفة الاستجابة Response Costs

وتم تنفيذ البرنامج في مدة لا تزيد عن ( ١٢ ) أسبوعاً بواقع جلستين كل أسبوع وزمن كل جلسة ( ٣٠ ) دقيقة. وأظهرت النتائج تحسناً ملحوظاً في الأداء الأكاديمي وفي السلوكيات التي تميز النشاط الزائد / قصور الانتباه مثل ( عدم الطاعة - عدم تكملة المهام - التعاون - السلوك الاجتماعي ) وأدى هذا التحسن إلى خفض النشاط الزائد لدى الأطفال.

وقام مكينل ( Mcneil, 1995 ) بتصميم برنامج يهدف لتنظيم وتعديل سلوك الأطفال ذوي النشاط الزائد / قصور الانتباه داخل غرفه الصف مع تحسين الأداء الأكاديمي بدون مشاكل. وقام الباحث بتصميم

٣ × ٢ برنامج لعب بالخدع السلوكية يتكون من عدة بطاقات حجمها **Trek Behavior** قدم تستخدم في عمل خدع سلوكية **Trek Behavior** وقام بعمل فريقيين من الأطفال الذين يعانون من النشاط الزائد / قصور الانتباه وكل فريق يتكون من (٦) أطفال، بحيث يشتراك الفريق الأول في اللعبة بينما يظل كل واحد من الفريق الثاني يلاحظ سلوك زميله في الفريق الأول في اللعبة . وأول خطوه في البرنامج هي استخدام الفريق الثاني تعابيرات الوجه في التعبير عن سلوكيات زميله في الفريق الأول في اللعبة بحيث يظهر الطفل في الفريق الثاني تعابيرات السعادة في حالة ملاحظة السلوك الصحيح لزميله في الفريق الأول والعكس ، يظهر تعابيرات الحزن في حالة السلوك الخاطئ ومن ثم يتبادل الفريقان مواقعهما في اللعبة فريق يؤدي السلوك والفريق الآخر يلاحظه ويكون ذلك في وقت محدد . والخطوة الثانية هي استخدام التعزيز في شكل لعبه أيضاً وهي تكون من عدد كبير من البطاقات حيث يوجد ٥٠ بطاقة تعزيز واستخدم أسلوب تكافه الاستجابة **Response** للسلوكيات الصحيحة وتم تسجيل هذه اللعبة على شرائط فيديو **Cost** ومسجل عليها طريقه عمل اللعبة والبرنامج السلوكي للأطفال ذوي النشاط الزائد / قصور الانتباه . حيث أثبتت النتائج بعد تكرار هذه اللعبة تحسناً في السلوك مع تعديله وتنظيمه عند هؤلاء الأطفال .

وأجرى فؤاد حامد الموافي (١٩٩٥) دراسة تجريبية لخفض النشاط الزائد لدى الأطفال باستخدام أسلوب التعاقد التبادلي **Contingency** وأسلوب التدريس الملطف **Gentle Teaching** على عينة مكونة من (٦٦) طفلاً في مرحلة ما قبل المدرسة في مدينة المنصورة وتم تصنيف العينة إلى ثلاثة مجموعات، مجموعتان تجريبيتان ومجموعة ضابطة لم تتلقى أي علاج وكل مجموعة بها (٢٢) طفل واستخدمت الدراسة قائمة تقدير للنشاط الزائد، تقرير المعلمات عن الأطفال – ملاحظة الباحث للطفل . وتلقت

المجموعة التجريبية الأولى علاجاً بأسلوب التعاقد التبادلي وهو أحد أساليب العلاج السلوكي وهو يقوم على مبدأ تقديم المكافآت مقابل السلوك المرغوب فيه الذي يسلكه الطفل " تدعيم إيجابي " وإذا أدى الطفل سلوكاً لم يرض عنه المعلم ولم يطلبه يعاقب بسحب جزء من التدعيم الإيجابي ويسمى ( تدعيم سلبي ) ويشمل التدعيم الإيجابي على الآتي :

بطاقات تحمل اسم الطفل، أو نجوم ذات ألوان أو أشياء عينه مثل أقلام – لعب ...) أو امتيازات إضافية مثل رحلة – لعب على الأرجوحة. وتلقت المجموعة التجريبية الثانية علاجاً بأسلوب التدريس الملطف، وهو اتجاه جديد في علاج العديد من المشكلات السلوكية لدى الأطفال المضطربين وذوي النشاط الزائد باعتباره من الوسائل العلاجية الجديدة للإقلال من سلوكيات سوء التوافق وخفض السلوك المشكّل دون استخدام عقاب، ونجح ذلك في علاج العديد من الاضطرابات السلوكية، وبهدف هذا الأسلوب إلى تكوين رابطة وجدانية قائمة على مسانده الطفل ذوي النشاط الزائد / قصور الانتباه من خلال تقوية علاقة الدفء والتقبيل والتبادل وتبني فيما لا تسلطية، مع التأكيد على مساندة الطفل وعدم تعرضه للأخطار، وقيم الصداقة والاعتماد على التفاهم المتبادل مع الطفل، وعدم التركيز على الخضوع والطاعة العميق، من أساليب التنشئة والعلاج في ضوء هذا الاتجاه يقوم على تكوين صلات وجدانية قوية بالطفل ذي النشاط الزائد / قصور الانتباه مع التركيز على التبادل والأخذ والعطاء مع القائمين على تربيته خلال خفض مظاهر السلوك المميز للنشاط الزائد / قصور الانتباه، وأثبتت النتائج فعالية أسلوب التعاقد التبادلي والتدريس الملطف في خفض النشاط الزائد لدى أطفال ما قبل المدرسة حيث ساعد هذين الأسلوبين بما يوفران من معززات إيجابية وسلبية للطفل ذو النشاط الزائد / قصور الانتباه على ضبط الذات وتنظيم المظاهر السلوكية للنشاط الزائد كما يوفر التدريس

الملطف مناخاً امناً وحب وتقدير وتسامح ودفء من المعلمين وهو ما يمكن أن يساعد في خفض النشاط الزائد / قصور الانتباه. ويعتبر هذا النموذج نموذج نمو وليس نموذج عجز، حيث يعمل على تقوية التدعيم الاجتماعي والانفعالي وتوجيهه إلى الأفضل بأسلوب تربوي .

دراسة ألزو (Alonso, 1997) صمم فيها برنامجاً واسحاً يسمى برنامج الخطوة الأولى First Step Program للتعرف على الطفل ذو النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD قبل سن ثلاث سنوات وتشخيصيه مبكراً قبل أن يستمر معه هذا الاضطراب في النمو ويسبب له إعاقات كثيرة. وصمم أيضاً برنامج لتدريب الوالدين الذين لديهم أطفال صغار يعانون من اضطراب النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD ويحتوي البرنامج على مجموعة من الخطوات :

- ١ - تطبيق استبيان تقدير الوالدين لسلوك النشاط الزائد، وهذا يوضح ما إذا كان الطفل تظهر عليه أعراض ADHD أم لا ، ويشتمل هذا المقياس على الخلفية الأسرية – التاريخ الطبي للأسرة والطفل .
- ٢ - وضع معايير للسن والمظاهر السلوكية المصاحبة لاضطراب النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD والتي تظهر من سن ٦ شهور إلى ٣ سنوات والتي تكون قريبة من مشاكل سلوكية أخرى .
- ٣ - ويساعد برنامج (الخطوة الأولى) الطفل ذا النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD بتدخلاته المختلفة التي يستخدمها الوالدين منها :
  - التدخل التربوي وحضور الوالدين الفصل مع الطفل في الحضانة وتدريبهم على كيفية التعامل مع هذا الطفل .
  - التدخل العلاجي السلوكي وكيفية استخدام أنواع مختلفة من التعزيز للسلوكيات الجيدة والمقبولة .

• التدخل الاجتماعي وفيه تنمية مهارات الوالدين الاجتماعية وكيفية التحكم في الانفعالات ومفاهيم البيئة الاجتماعية في حياة الطفل وأثبتت نتائج تطبيق هذا البرنامج في خفض الضغوط الأسرية وزيادة مهارات الوالدين من أجل أن يعيش الطفل ADHD في بيئه يساعده فيها السلوك المناسب، وثبت أيضاً أن هذا البرنامج يساعد على خفض مظاهر النشاط الزائد / قصور الانتباه . ADHD

وفي دراسة تقييميه قام بها لاث ولندركامب ( Lauth & Lauth 1998 ) لبرامج تنظيم السلوك لعلاج الأطفال ذوي النشاط الزائد / قصور الانتباه بهدف معرفة درجه ترابطها ببعضها . على عينه مكونه من ( ١٨ ) طفلاً في سن المدرسة ويعانون من اضطراب النشاط الزائد / قصور الانتباه ولا يعانون من أمراض عصبيه أو نفسيه ولا يتلقون أي دواء علاجي من الأدوية المنبهة أو المنشطة وطبق على العينة برامج تنظيم السلوك بهدف تنظيم السلوك الفوضوي وسلوك الطاعة والنظام من خلال الأنشطة المقدمة في هذه البرامج ولمدة ثلاثة فصول دراسيه . وتشتمل هذه البرامج على تدريب الطفل على عمليات تنظيم السلوك المختلفة وتدريب الوالدين والمشتركين في البرامج من خلال ورش عمل على عمليات الشرح - النمذجة لعب الأدوار مع التغذية الراجعة - ومهارات تنظيم السلوك . ثم قام الباحثان بتطبيق استبيان يجمع فيه معلومات عن هذه البرامج وممارساته العملية . وأظهرت النتائج امتثال الأطفال للطاعة والنظام في المواقف والأنشطة المقدمة في هذه البرامج، وهذا يدل على درجة اتفاقها في تنظيم سلوك الأطفال ذوي النشاط الزائد / قصور الانتباه، وأعتبرها المعالجان كوثيقة تدل على درجة عالية من الرضا وتأكيد الذات .

وتهدف دراسة عفاف حداد وباسم دجاجه (١٩٩٨) إلى استكشاف فاعليه برنامج في التدريب على أسلوب حل المشكلات واستخدام أسلوب الاسترخاء العضلي في ضبط التوتر النفسي لحوالي (٣٠) طفلاً في سن ١١ - ١٢ سنة في الصفين السابع والثامن، ويعانون من التوتر النفسي على أنه عرض من أعراض النشاط الزائد لدى الأطفال. وتم تقسيم العينة إلى ثلاثة مجموعات :

- ١) المجموعة التجريبية الأولى تلقت تدريباً على أسلوب حل المشكلات من خلال البرنامج .
- ٢) المجموعة الثانية تلقى أفرادها تدريباً على أسلوب الاسترخاء العضلي .
- ٣) والمجموعة الثالثة ضابطة لم تلق أي تدريب .

واستخدمت الدراسة برنامجاً إرشادياً جمعي باستخدام أسلوب حل المشكلات Scientific Problem Solving والأسلوب الآخر هو أسلوب الاسترخاء العضلي Muscle Relaxation ويهدف البرنامج الأول باستخدام أسلوب حل المشكلات إلى تخفيض حدة التوتر النفسي لدى الأطفال من خلال (١٠) جلسات بواقع (٤٥) دقيقة لكل جلسة لمدة خمسة أسابيع واشتملت الجلسات الأولى (١ - ٣) على التعريف بالبرنامج وأهدافه ومحتواه . واشتملت الجلسات من (٤ - ٩) على التعريف بالخطوات العلمية لأسلوب حل المشكلات والتطبيقات العملية المرافقة بها . وفي الجلسة العاشرة تم تقييم مدى اكتساب الأعضاء لمهارة أسلوب حل المشكلات وانتهاء الجلسات .

ويهدف البرنامج الثاني باستخدام أسلوب الاسترخاء العضلي إلى تخفيض التوتر النفسي عن طريق بعض التدريبات الحركية على الاسترخاء مسجله على شرائط كاسيت وزوّدت على الأطفال . ويساعد هذا الأسلوب أيضاً على تركيز الانتباه وذلك من خلال (١٠) جلسات بواقع (٤٥) دقيقة

لكل جلسة قبل البرنامج السابق ولمدة خمسة أسابيع. وأظهرت النتائج فروقاً دالة إحصائياً بين المجموعتين التجريبيتين والمجموعة الضابطة وكانت لصالح المجموعتين التجريبيتين، حيث انخفض مستوى التوتر النفسي لدى الأطفال، مما يدل على اكتسابهم لمهارات حل المشكلات وشعورهم بالسعادة أثناء استخدام أسلوب الاسترخاء العضلي .

وعرض دانفورث ( Danforth, 1998 ) برنامجه لتنظيم السلوكية المعكوسة Oppositional behavior للأطفال ذوى النشاط الزائد قصور الانتباه عن طريق البطاقات التبعية لتنظيم السلوك Behavior Management Follow Chart واشتراك في هذا البرنامج ثلاثة مجموعات:

– المجموعة الأولى من المتخصصين والمهنيين والمشرفين التربويين والأخصائيين النفسيين والمرشدين، والأخصائيين الاجتماعيين والطبيب المعالج ، الوالدين والمعلمين .

– والمجموعة الثانية من المدرسين الذين يعملون مع الطفل ذي النشاط الزائد / قصور الانتباه والسلوك المشكك .

– والمجموعة الثالثة من أساتذة الجامعات المهتمين بتنظيم السلوك.

ويهدف البرنامج إلى :

– تنظيم السلوك الفوضوي بواسطة بطاقات تبعية لدى الأطفال ذوى النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD .

– تعليم كل المشتركين كيفية تقديم التعليمات التي تعمل على زيادة قدره الطفل على الطاعة .

– توضيح متى وكيف نتعامل مع الطفل في المناوشات أو الحوار .

– التدريب على استخدام التأديب اللفظي الذي يساعد على خفض أحتمالية السلوك السيء

– التدريب على استخدام التحذيرات عندما لا يطيع الطفل التعليمات

- التدريب على كيفية تنظيم وقت الراحة للطفل ومعرفة قدراته ، وكيف يبدأ ، وما هي الأنشطة المناسبة للطفل في هذا الوقت ، وكيف تنهيه بطريقة تجعل الطفل يسلك سلوكاً حسناً بعد الراحة مباشرة .
- التدريب على كيفية استخدام الإرشادات اللفظية مع الطفل ADHD
- التدريب على كيفية ردع السلوكيات المكررة غير الطبيعية ورفضها
- توضيح متى وكيف تتحرك أثناء وتنظيم السلوك إلى الخطرة التي يليها مع التدخل في وقت الاستجابة .
- تنمية القدرة على معرفة خصائص سلوك الأطفال ذوي النشاط الزائد وقصور الانتباه ADHD وكيف يمكن تشكيله حتى لا يتم اثارفه عن المعدل .
- تعلم كيفية استخدام أداة التدريس المصغر للأطفال ADHD للتعرف على دور الوالدين في الإشراف والمتابعة .

واستخدم في هذا البرنامج تكتيكات تدريب الوالدين الذين لديهم أطفال ذوي النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD مع اضطراب في السلوك وذلك من خلال ورش عمل تجريبية للمشاركين في البرنامج تشمل : الشرح - النمذجة - لعب الأدوار مع التغذية الراجعة، وتدريس مهارات تنظيم السلوك في سلسلة متتالية، وفي نفس الوقت تستخدم البطاقات المتتابعة في تناسق مع كيفية استخدامها مع الطفل، وأول استجابة تصدر من الكبار عندما يريدون تعليم الطفل كيف يطيع الأوامر تعتبر هي أول مهارة تعلّم . ثم يتحرك بانتظام تجاه الخطوات التي تليها باتباع الكروت أو البطاقات الخاصة بالبرنامج. ويوصي الباحث بأن هذا البرنامج يعتبر اتجاه نحو التكامل . ويجب أن تتتوفر البرامج الشاملة والمتخصصة والتي تركز على طرق التعامل مع السلوكيات التي تعتبر مشكلة عند الطفل .

ووضع مركز النشاط الزائد بإنجلترا (ADD Center 1999) برنامجا سلوكيًا في التركيز على المهام On-Task Get with the Behavior. ويهدف هذا البرنامج إلى :

- ١ - مساعدة التلميذ ذوي النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD في الفصل أو المنزل على تنظيم سلوكهم لكي يكون مقبولا .
- ٢ - وضع خطه للعمل على تدعيم السلوك الإيجابي .
- ٣ - تعليم الطفل المهارات التي تساعدة لكي يكون مقبولا .

وأي خطه تعد للتعامل مع الأطفال ذوي النشاط الزائد يجب أن تكون قصيرة ومحددة الهدف وأن يكون بها قوائم للأهداف السلوكية ويفضل العمل على اثنين أو ثلاثة فقط من السلوكيات المتوقعة من الأطفال ذوي النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD مثل :

- ١ - وضع المهمة On Task إذا استطعت أن تبقى الطفل في عمل أو مهمة فإنك قد تكون حفقت جزءاً كبيراً من السلوك المرغوب فيه . وإذا كان العمل به صفة التحدي فيبقى الطفل في مقعده ويقوم بعمله ولا يزعج الفصل .
- ٢ - التنفيذ من أول مرة Compliance with Firest Request أي إذا طلب من الطفل أن يحضر شيئاً ما فالهدف من ذلك هو أن يأتي بالشيء من أول مرة .
- ٣ - أسلوب التحدث المناسب Appropriate Talk only لكي يوقف المعلم أسلوب تحدث الطفل غير المناسب فيوصي باستخدام أساليب التعزيز عند استجابة الطفل للتحدث المناسب . وفي نهاية اليوم الدراسي تقيم خطة الطفل ويتم التأكد إذا كان حقق الأهداف المطلوبة أم لا .  
وتشمل الخطة على إرشادات في الجانب العملي هي :

١ - عندما تامر الطفل يجب أن يكون الأمر محدداً ومباشراً وغير مسيطر عليه بشكل يعيقه

٢ - قل أولاً "انتبه" ثم قم بتسمية السلوك الذي تود رؤيته مثل [أريدك أن ... ، أريد الاستماع ....] وكثير من الأطفال ذوي النشاط الزائد لديهم صعوبة في نمذجه السلوك ومن هنا يجب على المعلم أن يدع تلميذ آخر يشرح ذلك أمام الطفل.

٣ - كن حريصاً في مفرداته وكلماتك ولا تنهي السؤال بقولك "موافق"؟ فعندما ينتهي الطفل من العمل قل له مثلاً "هذا عمل جيد" "لقد شاهدت ما أريده بالضبط"

٤ - تجاهل السلوكيات التي لا تريدها.

٥ - تحدث ثم أدر وجهك Speak and Spin وهذه تقنية تجمع بين عملية تسمية السلوك غير المرغوب فيه لكسر التواصل العيني والابتعاد عن الطفل مبيناً أن المحادثة انتهت.

وغالباً الأطفال ذوي النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD سوف يتاثرون بفاعلية بوحدة أو أكثر من الخطوات التالية :

ابداً المهمة - استمر في المهمة - أكمل المهمة - تنقل من مهمة إلى أخرى - تفاعل مع الآخرين - تتبع التعليمات - اعمل بدقة وفي المستوى العادي - رتب المهام ذات الخطوات المتعددة .

ووضعت (علا عبد الباقى ١٩٩٩) نموذج لبرنامج تعديل السلوك لخفض النشاط الزائد لدى الأطفال باستخدام بعض أساليب العلاج السلوكي. ويهدف هذا البرنامج إلى الحد من المظاهر السلوكية للنشاط الزائد لدى الأطفال باستخدام أساليب العلاج السلوكي مثل أسلوب "التعزيز" وأسلوب "الستعم بالنموذج". ويمكن تطبيق البرنامج من قبل المعلم أو الأخصائى الاجتماعى أو الأخصائى النفسي كما يمكن تطبيقه من قبل أحد الوالدين أو أحد الأخوة

الكبار ويمكن إجراؤه بطريقه فردية أو بصوره جماعية ولنجاح العلاج لابد من الالتزام بعدد الجلسات الواردة في البرنامج وبنتعميمات البرنامج أثناء تنفيذه . والبرنامج يتضمن عدد (٢٤) جلسة تم توزيع الموضوعات المختارة من مادتي الحساب والعربي على هذه الجلسات بواقع (١٢) جلسة في مادة الحساب ، (١٢) جلسة في مادة العربي . وتنتم جلسات البرنامج بالتبادل على المادتين المذكورتين بحيث تشتمل الجلسة الواحدة على مادة واحدة . وفي الجلسة التي تليها تكون في المادة الأخرى وهكذا .

ويمكن تنفيذ البرنامج وفقاً لثلاث طرق إجرائية كما يلي :

**الطريقة الأولى** : باستخدام أسلوب " التعزيز " فقط .

**الطريقة الثانية** : باستخدام " التعلم بالنموذج " مع الحث .

**الطريقة الثالثة** : باستخدام كل من " التعلم بالنموذج و " التعزيز " معاً " وبعد انتهاء الجلسات الأساسية الأربع والعشرين يقوم شخص آخر بتكرار تنفيذ (١٠) جلسات إضافية وهذا الشخص يمكن أن يكون أحد الأشخاص السابق ذكرهم وتجري الجلسات بواقع ثلاثة جلسات أسبوعياً وعدم إجراء أكثر من جلسة واحدة في اليوم ومدة الجلسة في الطريقة الأولى عشرون دقيقة، وفي الطريقة الثانية : عشرون دقيقة وفي الطريقة الثالثة: خمس وعشرون دقيقة . وبعد تطبيق البرنامج سوف يخضع النشاط الزائد لدى الأطفال ويتم تخلص الطفل من الحركات المفرطة غير المقبولة ، عوده الطفل إلى الهدوء واندماج الوالدين في الحياة العامة ، عوده الهدوء لحجره الدراسة واندماج الطفل في الأنشطة مع زملائه ويتحقق التكيف ، تنخفض المشكلات الدراسية والاجتماعية والنفسية المرتبطة بالنشاط الزائد وتتنخفض المشكلات الصحية الناجمة عن النشاط الزائد ويعود الطفل إلى حالته الطبيعية .

## **ثانياً عرض لبعض البرامج السلوكية والدراسات لخفض النشاط الزائد قصور الانتباه لدى الأطفال غير العاديين .**

استخدم كوبكين (Koppekin 1994) برنامجاً للضبط الذاتي Self-Statement كأحد أشكال إعادة التنظيم المعرفي، ويهدف إلى خفض السلوك الاندفاعي لاستجابات الأطفال ذوي النشاط الزائد / قصور الانتباه وتدريب الطفل على تعديل أنماط التحدث للذات والذي يؤدي بدوره إلى تعديل السلوك . ويطبق هذا البرنامج فردياً على عينة من الأطفال المختلفين عقلياً في سن (١٢) سنة ونسبة ذكائهم ٦٠ - ٧٥ ويعانون من اضطراب النشاط الزائد قصور الانتباه وتختلف جلسات البرنامج باختلاف الباحثين والمعالجين كما يتوقف على نوعية السلوك المضطرب أي لا يوجد عدد محدد لجلسات البرنامج . واستخدم هذا البرنامج التعليمات الذاتية للذات في كيفية التمييز بين المثيرات . ويمكن تنفيذ البرنامج على ثلاثة مراحل هي:

١ - المرحلة الأولى : قامت على استخدام المثيرات في التمييز حيث قام الكيلانيكي بإعطاء تعليمات لأطفال العينة بالتمييز بين ثلاثة أصناف متنوعة من الأطعمة تتشابه كثيراً مع بعضها وتختلف من حيث صلاحتها للأكل ويقوم كل طفل بالتمييز بين الأطعمة الصالحة وغير الصالحة للأكل .

٢ - المرحلة الثانية : وفيها يتعدّث الطفل ذاته بصورة معونة أثناء التمييز بين الأطعمة الصالحة وغير الصالحة للأكل .

ويمكن استخدام وسائل " التعزيز " وفقاً للفترة الزمنية التي يستغرقها الطفل في الوصول إلى الاستجابة الصحيحة .

٣ - المرحلة الثالثة : اعتمدت على تحدث الطفل لنفسه بطريقه غير معونة، وفيها يتم التمييز بين الأطعمة وفقاً لكمية الطعام .

وأثبتت النتائج تحسن هؤلاء الأطفال في قدرتهم على التمييز بين نوعين من المثيرات وفقاً لصالحيتها وكميتها بالإضافة إلى خفض السلوك الاندفاعي في التمييز لدى هؤلاء الأطفال باستخدام برنامج الضبط الذاتي المعتمد على التعليمات الذاتية . وأخيراً ثبت فعالية برنامج الضبط الذاتي في خفض المظاهر السلوكية للنشاط الزائد / قصور الانتباه لدى الأطفال المختلفين عقليا ، حيث أن العلاج السلوكي المعرفي لتعليم الأطفال هو عملية دمج الإجراءات السلوكية والمعرفية .

وتؤكدأ لفعالية برنامج التدريب على ضبط الذات في خفض النشاط الزائد / قصور الانتباه لدى الأطفال المختلفين عقليا، أجرى سعيد بن عبد الله والسيد إبراهيم السمادوني(١٩٩٨) برنامج التدريب على الضبط الذاتي Self- Instruction على عينة من الأطفال المختلفين والقابلين للتعلم ومن يعانون من اضطراب النشاط الزائد / قصور الانتباه في مدينة الرياض، حيث كان عدد الأطفال (١٠) أطفال بمتوسط عمر قدره (١٣,١) سنة واختيرت العينة من غير المصابين بأي أمراض عصبية أو اضطرابات نفسية ولا يكون تحت تأثير أي عقاقير طبية وتتراوح نسبة ذكائهم ما بين ٦٠ - ٧٠ باستخدام وكسنر لذكاء الأطفال . وتم تقسيم العينة إلى مجموعتين ضابطة عددها (٥) أطفال وتجريبية عددها(٥) أطفال واستخدم الباحثان قائمة كونر لتقدير سلوك الطفل وقائمة تقدير سلوك الطفل طبقاً لمعايير الدليل التشخيصي الإحصائي . واستخدم برنامج التدريب على الضبط الذاتي في علاج اضطراب النشاط الزائد / قصور الانتباه

ويهدف البرنامج المستخدم في الدراسة إلى مساعدة الأطفال المختلفين عقليا من الدرجة البسيطة والذين لديهم اضطراب النشاط الحركي الزائد / وقصور الانتباه على كيفية ضبط الذات عن طريق تقديم التعليمات

للذات. ويعتبر هذا الأسلوب أفضل الأساليب التي تجعل الضبط نابعاً من الداخل وليس من الخارج. ويختلف عدد جلسات البرنامج باختلاف الباحثين والمعالجين كما يتوقف على نوعية السلوك المضطرب وتتألف البرنامج في هذه الدراسة من (١٨) جلسة يتراوح ما بين ٣٠ - ٤٠ دقيقة بالإضافة إلى الجلسة التمهيدية التي تم فيها لقاء الباحثان بالعينة التجريبية واستخدما في البرنامج بعض الاستراتيجيات مثل : التعلم بالأئمودج - لعب الأدوار وتقدير الذات ، بعد دمجها.

واستخدم في هذا البرنامج اللعب التي يفضلها الطفل للبدء بها في تعليم الطفل التحدث للذات. والأسطحة التي تتطلب استراتيجيات معرفية متعاقبة بدرجة عالية . وأسلوب رفاق الطفل وكيف يقومون بالأداء المطلوب أمام الطفل ليقوم بتنقية نفس الأداء بعد ذلك. التحرك خلال جلسات البرنامج وفقاً لحالة الطفل وتعليمه مجموعة متنوعة من العبارات المقدمة للذات والتي تشتمل على عدد متنوع من عبارات حل المشكلة ومعايشتها وتعزيز الذات. إضافة إلى تدريب الطفل على العبارات المقدمة للذات وتدريبه على ابتكار عبارات ترتبط بالمطلوب وعدم موافقته على العبارات التي يتلفظ بها من غير تفكير أو بصورة آلية. مع وجود المعالج النشيط الذي يستجيب إيجابياً وبسرعة للطفل، تعليم الطفل استخدام أسلوب التعليمات الذاتية حتى مع الاستجابات الضعيفة ذات الشدة المنخفضة والتي تتعارض مع الاستجابات الاتكافية التي تظهر في السلوك. وممارسة التدريب على التخيل خلال جلسات البرنامج . وأخيراً تم استخدام التغذية الراجعة اللغوية المشروطة

وأظهرت النتائج فعالية برنامج الضبط الذاتي الذي يقوم بتدريب الأطفال المختلفين عقلياً والقليلين للتعلم على كيفية تقديم التعليمات اللغوية للذات في خفض الحركات المفرطة التي كان يحدثها أطفال المجموعة التجريبية قبل تنفيذ

البرنامج ، كما انخفض متوسط تقديرات المعلمين للنشاط الزائد وعدم القدرة على الانتباه على قائمة كونر وحدث انخفاض أيضا في السلوك الانفعالي .

وصمم زنتال (Zentall, 2000) برنامجاً للتعلم الفردي . (IEP) Individualized Education Program ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين قدرات الطفل المعاق ذي الاحتياجات التعليمية الخاصة والذي يعاني من اضطراب النشاط الزائد / قصور الانتباه وأيضاً للطفل العادي الذي يعاني من النشاط الزائد / قصور الانتباه وبعد تشخيص هؤلاء الأطفال والتعرف عليهم يقدم البرنامج بانتظام لتعديل سلوك معظم هؤلاء الأطفال ويمكن أن يطبق البرنامج بصورة فردية أو جماعية

ويتضمن البرنامج المناهج التعليمية والتربوية للأطفال العاديين في المدارس الابتدائية ويشتمل البرنامج على دليل إرشادي للتدخلات التربوية بواسطة المعلم لتحسين الأداء الأكاديمي والاجتماعي للأطفال ذوي الحاجات الخاصة ، والأطفال العاديين الذين يعانون من النشاط الزائد / قصور الانتباه .  
وفيما يلي أهم هذه الإرشادات :

– إرشادات عامة لبرنامج الفردي لخفض النشاط الزائد قصور الانتباه ADHD

أولاً – أن يوضع الأطفال مع المدرسين الذين لديهم القدرة على استخدام أسلوب حل المشكلات والذين يجيدون استخدام الثواب والعقاب .

ثانياً – أن يوضع الطفل في بيئة مشابهة لبيئته الطبيعية مثل

– تمثيل الأدوار

– وضع جدول يومي للواجبات .

— تنبيهات بالتغييرات التي تحدث بالجدول .

— تخصيص وقت مناسب لكل مهمة .

— توفير مكان هادئ للعمل لإنجاز المهام .

— وضع خطط لمحفوظات البرنامج الأكademie .

— تصنیف الأطفال في مجموعات مشابهة .

— جعل العمل الأكاديمي في الفترة الصباحية .

ثالثاً — تعديل المنهج ويشتمل على الآتي :

— خلط الأنشطة الهامة بأخرى ذات الاهتمام الأقل .

— تقديم كل الإجراءات الخاصة بتعليم الكمبيوتر .

— تقديم وسائل إيضاح جيدة .

— تعليم أسلوب التنظيم ومهارات الدراسة .

— استخدام استراتيجيات التعلم مثل الربط والتحليل .

— استخدام المراجع البصرية من أجل التعليمات السمعية .

— إرشادات إضافية لبرنامج التعلم الفردي لخفض النشاط الزائد / قصور

#### الانتباه ADHD

— النشاط الحركي لتفریع الطاقة الحرکية الزائدة مثل تحريك الأطفال في غرفه الصف كالسماح لهم بالوقوف ثم الجلوس الحر .

— استخدام الأنشطة كنوع من المكافأة مثل ريادة الفصل أو كتابه الأسماء على السبورة ... الخ .

— استخدام الاستجابات النشطة في التعليمات مثل ( الكلام — المركبة — التنظيم )

— إرشادات عامة للطفل ADHD غير قادر على الانتظار :

— يستخدم الاستجابات اللغوية أو الحركية مثل ( الاستمرار في عمل المهام وفي نفس الوقت ينتظر مساعدة المدرس له ) .

— التخطيط لأي عمل عندما يكون الطفل متزلاً شيئاً ما مثلاً ( يسمح للطفل باللعب أثناء انتظاره شيء ما ، أو يكتب بعض المعلومات الهامة ... ) .

— عندما تصبح القدرة على الانتظار غير محتملة، شجع الطفل على القيادة ولا تفترض أن سلوك الاندفاعية أو السلوك العدواني مقصود واقتراح بديلات أخرى للسلوك ( مثل القراءة بالدور أي كل فرد يقرأ تلو الآخر ) وهذا يساعد على إنجاز المهام .

— إرشادات عند فشل الطفل ADHE على الاستمرار في الانتباه لإنجاز المهام والأنشطة : — بسط المهام ولا تجعلها طويلة أو داخل فترات الراحة بين أجزاء المهام أو أوقات مختلفة أو هجاء بعض الكلمات أو حل بعض المسائل الرياضية .

— اجعل المهام محببة للطفل مثل ( تقسيم الأطفال إلى مجموعات صغيرة، وقدم الأنشطة المختلفة، واستخدم بعض الألعاب الحركية أثناء المهام ) .

— إرشادات الأطفال ADHD الذين لديهم عدم طاعة ويفشلون في إتمام المهام :

— تزويد الاختيارات لبعض المهام الممتعة للطفل ويسمح المعلم لهؤلاء الأطفال الذين يعانون من النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD باختيار محدد للمهام أو الموضوعات أو الأنشطة وعلى المدرس تحديد الأنشطة التي يحبها الطفل ويستخدمها كحافظ له .

— التأكيد من مناسبة المهام مع قدرات الطفل التعليمية ومن المحموم إتمام هذه المهام عندما يسمح لهم بالاستجابة بطرق متنوعة مثل ( استخدام الكمبيوتر — شرائط الفيديو ) وعندما يكون هناك صعوبة في أداء الواجبات المنزلية أجعل هذه المهام متدرجة من السهولة إلى الصعوبة وتأكد أن عدم التنظيم ليس سبباً لعدم إتمام المهام .

— إرشادات للأطفال الذين يعانون من النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD والذين لديهم صعوبة في بداية المهام مثل :

— شجع استخدام مفكرة الملاحظات .

— أعط توجيهات للكتابة وللتدريبات الشفوية .

— ضع معياراً للعمل المقبول .

— إرشادات لاستكمال الواجبات .

— أعط الطفل مزيداً من المهام المنظمة التي يستخدم فيها الكمبيوتر أو مفكرة الملاحظات — اكتب الواجبات على السبورة وتتأكد من أن كل طفل كتبها .

— حدد أماكن في الفصل للكتب والملابس والواجبات في جاتب من الفصل واجعل الواجبات الحديثة أو الجديدة في جاتب آخر في الفصل ويمكن عمل مثل ذلك في المنزل .

- علم هؤلاء الأطفال الذين يعانون من النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD أنه عندما يتحرك من مكان إلى آخر أن يسأل الطفل نفسه هل أخذت كل شئ تريده معك وهذا مثال لعلاج النسيان

- إرشادات لتحسين احترام الذات للأطفال الذين يعانون من النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD /

إن معظم الأطفال ذوي النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD والذين لم يشخصوا ولم يعالجوا يعانون من ضعف في احترام الذات ومعظمهم يظهر عليهم علامات متوسطة أو خفيفة تدل على الإحباط. وهذا الشعور ينبع من إحساس هؤلاء الأطفال بالفشل الشخصي ويمثل العالم بالنسبة لهم أنه مكان غريب غير محب لهم. غير أن التغذية الراجعة في صوره العقاب أو اللوم تبدوا وكثيراً ثابتة في حياة هؤلاء.

وبعد تطبيق هذا البرنامج لوحظ تقدم كبير في القدرات التعليمية وانخفاض ملحوظ في مظاهر النشاط الزائد لدى الأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة ذوي النشاط الزائد / قصور الانتباه وأيضاً لدى الأطفال العاديين والذين يعانون من اضطراب النشاط الزائد / قصور الانتباه. ويوصى واضع البرنامج خبراء التربية بتنظيم برامج خاصة بتحسين احترام الذات واستخدام فنون تنظيم السلوك واستراتيجيات التدخلات التربوية وذلك لتشجيع الأطفال ( العاديين - غير العاديين ) الذين يعانون من النشاط الزائد / قصور الانتباه وتحسين احترام الذات لديهم حتى يشعروا أنهم أكفاء ولهم قيمة في المجتمع، وهذا يؤدي إلى نجاحهم في الحياة .

وتهدف دراسة سعيد عبد العزيز محمود (٢٠٠١) إلى الكشف عن تأثير برنامج التدخل المهني باستخدام نموذج التركيز على المهام في خفض مظاهر النشاط الزائد لدى الأطفال ذوي الحاجات الخاصة "فئة الإعاقة العقلية المتوسطة" وتكونت عينه الدراسة من (٢٢٥) حالة ثم إخضاعها للتجريب باستخدام نموذج التركيز على المهام وقد اختبرت هذه العينة بطريقة عشوائية منتظمة من (٥٣) حالة تعانى من مظاهر النشاط الزائد بمنطقة القصيم بالسعودية .

— واستخدم الباحث في دراسته استماراة ملاحظة سلوك النشاط الزائد المكونة من أربعة بنود لسلوكيات التي تدل على النشاط الزائد وهي :

١ — عدم الجلوس بهدوء داخل الفصل .

٢ — سلوكيات نمطية .

٣ — قصور في الوجبات المدرسية .

٤ — سلوكيات عدوانية .

وقام مدرس الفصل بتسجيل معدلات تكرارات عند الطفل يومياً ولمدة ثلاثة أسابيع . واستخدم مقياساً للنشاط الزائد ، والقياسات القبلية والبعدية لعينة الدراسة، وأظهرت النتائج وجود فروق دالة بين القياسين القبلي والبعدي وتنطبق ذلك تطبيق برنامج التدخل المهني بهدف خفض معدلات سلوك النشاط الزائد لدى أطفال العينة . وبرنامج التدخل المهني باستخدام نموذج التركيز على المهام Task Centered Model وهو أحد أشكال العلاج قصير المدى للتفاعل مع الأطفال من خلال تعليمهم بعض المهارات الاجتماعية في إطار مجموعة من المهام المحددة خلال فترة زمنية متوسطتها (٣) شهور يمارس فيها الأخصائي أدواره مع الطفل مسترشداً في ذلك بالأسس النظرية لهذا النموذج ومعتمداً على تنفيذ سلسلة من المهام الإجرائية في وقت محدد .

— ويتضمن تنفيذ البرنامج العلاجي عدة مراحل هي :

أولاً — مرحلة تحديد المشكلة وفيها

يقوم الباحث باكتشاف المشكلة وتحديد اسبابها

ثانياً — مرحلة تحديد الأهداف

حيث يحدد الأخصائي الأهداف التي يرغب في الوصول إليها مع كل

تلמיד من نتائج المقاييس المطبقة في هذه الدراسة .

ثالثاً — مرحلة التخطيط للمهام

حيث يقوم الأخصائي بتحديد الأفعال والإجراءات والأشنطة التي

سوف يمارسها الطفل لخفض النشاط الزائد حيث يستخدم الباحث فيها

مجموعة من الفنون العلاجية منها :

#### ١ — تكنيك الاستكشاف Exploration

— وفيه يتم الحصول على البيانات المتعلقة بالمشكلة وتوضيحها

والمهام التي تساعدها وكيفيه تنفيذها والصعوبات المتوقعة .

#### ٢ — تكنيك البناء Structuring

ويحاول فيه الأخصائي الاجتماعي تكوين قنوات اتصال ناجحة مع

الطفل ووضع تفسيرات تتفق مع هدف وطبيعة العلاج .

#### ٣ — تكنيك التشجيع Encouragement

و فيه استخدام عبارات التأييد والاستحسان لمشاعر الطفل أو سلوكه

عند تنفيذ المهمة .

#### ٤ — تكنيك التوجيه Direction

و فيه محاولة توجيه الطفل لاتخاذ القرار الذي يرتبط بأداء المهمة .

#### ٥ — تكنيك الفهم الواضح Overt Understand

و فيه يظهر الأخصائي الاجتماعي فهمه وتقديره لمشاعر أو سلوك

الطفل أثناء إنجاز المهمة سواء بالأساليب اللفظية أو غير اللفظية .

## ٦ - تكنيك التفسير Explanation

و فيه يركز الاخصائي على تأكيد فهم الطفل لنفسه ولتصرفاته و علاقته بالآخرين

## ٧ - تكنيك النمجة Modeling

ويستخدم فيه المعالج يقظته التامة واستجابات المتعاطفة وفهم واعي لمساعدة الطفل على التعبير عن مشاعره الحاضرة .

## ٨ - تكنيك لعب الأدوار Role Playing

و فيه إكساب الطفل المزيد من الفهم حول كيفية أداء الدور وهذا الأسلوب يعد نوعا من التدريب للطفل على كيفية تنفيذ المهمة .

رابعا : مرحلة تنفيذ المهام :

و ذلك من خلال متابعة الطفل و تشجيعه على الالتزام بـ برنامج العلاجي .

خامسا - مرحلة الإنتهاء :

حيث يراجع الأخصائي فيها ما تم إنجازه من مهام وما تحقق من أهداف ويحدد ما حدث من تغيرات في أسلوب الطفل عن طريق القياسات القبلية والبعدية وبرنامج التدخل المهني .

وأخيرا أسفرت نتائج برنامج التدخل المهني عن فاعلية نموذج التركيز على المهام في خفض مظاهر النشاط الزائد على عينه من الأطفال ذوي الحاجات الخاصة .

حيث حصل الباحث على انخفاض في معدلات السلوكيات النمطية بنسبة ٥٠% من مجموع الحالات وفي معدلات السلوك العدواني بنسبة ٤٠% من مجموع الحالات وفي معدلات أداء الواجبات وسلوكيات النشاط الحركي الزائد بنسبة ٧٦% من مجموع الحالات مما يدل على فاعلية هذا

البرنامج في خفض مظاهر سلوك النشاط الزائد لدى الأطفال ذوي الحاجات الخاصة " فئة الإعاقة العقلية المتوسطة "

أخيراً أوصت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (٢٠٠١) American Academy of Pediatrics فاعلية للأطفال ذوي النشاط الزائد وقصور الانتباه ( العاديين - غير العاديين ) والذي يمكن استخدامه في البرامج السلوكية لعلاج هؤلاء الأطفال حيث وضع جدولًا مبينا فيه الآتي :

#### جدول رقم (٤)

يوضح الفنون العلاجية الأكثر تأثيراً في الأطفال ذوي النشاط الزائد / قصور الانتباه

المثال	الوصف	الเทคนيك
الطفل الذي يكمل مهمة ويجيد استخدام الكمبيوتر	إعطاء تعزيز أو امتيازات غير متوقعة على أداء الطفل إذا كان جيداً	التدعم الإيجابي Positive reinforcement
الطفل الذي يعتدي بالضرب على أخواته - والطفل المندفع الذي يتطلب منه الجلوس لمدة خمس دقائق في ركن غرفه الصف	سحب التعزيز الإيجابي عندما يكون الأداء غير جيد أو في حالة وجود مشكلة سلوكية	حرمان لبعض الوقت Time - out
الطفل الذي يُضيّع وقته والذي أخذ امتيازات لتكميله واجباته المنزلية	سحب التعزيز أو الامتيازات غير المتوقعة على الأداء غير الجيد أو في حالة وجود مشكلات سلوكية	تكلف الاستجابة Response Cost
يحصل الطفل على نجوم ملونة في حالة تكملة المهام ويفقداها إذا لم يكمل المهام ، ويحصل الطفل على مجموعة من النجوم الملونة، في نهاية الأسبوع كجائزة أو	يضم التعزيز الإيجابي وتكلفة الاستجابة وفيها يحصل الطفل على التعزيز والامتيازات غير المتوقعة على أداء السلوك المرغوب فيه ويفقد التعزيز أو الامتيازات على السلوكيات غير المرغوب فيها	بونات التعزيز Token economy

## تعقيب :

تعدّت البرامج السلوكية التي تساعد في خفض المظاهر السلوكية للطفل ذوي النشاط الزائد / قصور الانتباه حيث أنها أكثر الفئات شيوعاً بين أطفال المدارس. لذلك اهتم بها الباحثون والدارسون خوفاً من تفاقم هذه المشكلة في مرحلة المراهقة أو الرشد وكذلك اهتمت الدراسات بفنين سلوكيّة مختلفة من خلال برامج مقدمة لخفض هذا الاضطراب لدى الأطفال.

ويتبّع من العرض السابق وجود جزأين أساسيين للبرامج السلوكية الأولى يحتوى على خمسه عشر برنامجاً اهتمت بخفض المظاهر السلوكية للنشاط الزائد / قصور الانتباه لدى الأطفال العاديين والثاني عدد خمس برامج ودراسات اهتمت بخفض المظاهر السلوكية للنشاط الزائد / قصور الانتباه لدى الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ورغم هذا الاهتمام نلاحظ قلة البرامج والدراسات الحديثة التي اهتمت بعمل برامج لخفض مظاهر النشاط الزائد / قصور الانتباه لغير العاديين بمختلف فئاتهم .

وهناك برامج دراسات اهتمت بتعديل وتنظيم السلوك وأغلبها استخدمت أساليب التغذير للسلوك الحسن، فأثبتت نجاح هذه الفنين في خفض مظاهر النشاط الزائد / قصور الانتباه مع رفضها لاستخدام أساليب العقاب تماماً وعدم استخدامها كأساليب تنفيريّة في تعديل السلوك ربما الأفضل استخدام أسلوب "تكلفة الاستجابة - Cost Response" مما يدعو إلى أن يكون الطفل مسؤولاً عن استجابته وسحب الامتيازات التي يحصل عليها الطفل في حالة عدم الاستجابة الحسنة، وهذا الأسلوب أفضل من العقاب، ويُعتبر من أنجح الأساليب العلاجية المستخدمة في برامج خفض مظاهر النشاط الزائد / قصور الانتباه .

والبعض الآخر من الدراسات اهتمت باسلوب جديد وهو التدريسي الملطف "Gentile Teaching" حيث انه يشترك مع اساليب العلاج السلوكي في بعض الجوانب كتحديد المشكلة ورسم الأهداف المسبقة للعلاج واستخدام فنیات التدعيم الا أنه يختلف عن المناهج السلوکية التقليدية في التأكيد على القيم في عمليه التفاعل وتكوين علاقات متبادلة وهذه تعتبر من الفنیات المفيدة والناجحة في خفض مظاهر النشاط الزائد لدى الأطفال .

ونلاحظ أيضاً مما سبق قلة البرامج السلوکية لدى أطفال ما قبل المدرسة، وربما يرجع ذلك إلى صعوبة التشخيص لهؤلاء الأطفال في هذه المرحلة العمرية لتشابه المظاهر السلوکية للنشاط الزائد مع المشكلات السلوکية الأخرى التي تظهر في هذه المرحلة العمرية .

ونلاحظ أيضاً قلة البرامج والدراسات العربية التي اهتمت بعمل برامج لخفض المظاهر السلوکية للنشاط الزائد، وهذا يؤكد الحاجة إلى المزيد من الدراسات العربية لبرامج خفض النشاط الزائد لدى الأطفال العاديين - وغير العاديين .

## **الفصل الخامس**

### **برامج تدريب الوالدين**

## **الفصل الخامس – برامج تدريب الوالدين :**

**أولاً – عرض لبعض برامج تدريب الوالدين لخفض النشاط الزائد / قصور الانتباه لدى الأطفال العاديين .**

ويتضمن هذا الاتجاه عرضا لأبرز البرامج والدراسات الحديثة التي عالجت مشكلته النشاط الزائد لدى الأطفال عن طريق تدريب الوالدين لأنها أكثر الطرق تأثيراً في خفض المظاهر السلوكية لدى الأطفال ذوي النشاط الزائد/ قصور الانتباه . ADHD

وتهدف هذه البرامج إلى تدريب الوالدين على كيفية تنظيم سلوك أطفالهم والعمل مع الطفل ذوى النشاط الزائد / قصور الانتباه كي يكتشف بنفسه نماذج السلوك والطرق البديلة للسيطرة على انفعالاتهم، والعمل على اكتساب مهارات جديدة في أساليب العلاقات الأسرية بهؤلاء الأطفال وتدريب الأسرة على تكثيف التدعيم الإيجابي للسلوك المرغوب فيه لدى الطفل.

ويهتم أيضا بتدريب الوالدين والأطفال ذوى النشاط الزائد على كيفية وضع نهاية لكل مهمة ثم يكafa الطفل بعد الانتهاء من كل جزء من المهمة، وتوزيع الواجبات المدرسية على فترات، مع وضع أولويات لتنفيذ المهام وتوفير الجو الهدئ والمكان المناسب لتنفيذ المهام مع مراعاة أوقات الراحة بين كل مهمة وأخرى. أخيراً تهدف إلى خفض ضغوط الوالدين وخفض مظاهر النشاط الزائد قصور الانتباه للطفل .

وقد طور بلاك مور وزملائه (Blak More,et . al., 1993) برنامجا لتدريب الوالدين لعينة من خمس عشرة أسرة لديها أطفال يعانون من نشاط زائد / قصور انتباه ADHD . ويهدف هذا البرنامج إلى إكساب الوالدين المهارات المطلوبة للتحكم في سلوك الطفل مع كيفية استخدام أساليب التعزيز الملحقة في البرنامج والتي تعدل الدافعية التلقائية أو

الفطرية للطفل من خلال تقديم موافق للتحكم في السلوك . ويعتمد البرنامج على النتائج التي ترتبط بالسلوك المستهدف أكثر من اعتماده على التعزيز المستخدم في تعديل السلوك. مثال (إذا كان الموقف عن آداب المائدة وأساليب الطعام فيجب الاهتمام بسلوكيات الطفل على أن يقوم أكثر من مرة من على مائدة الطعام بدلاً من الاهتمام بسلوكيات الخاصة بموافقات الطعام، وأشارت النتائج إلى أن هذا البرنامج يساعد على خفض ضغوط الوالدين، ومن المظاهر السلوكية للنشاط الزائد/ قصور الانتباه للطفل ADHD في المنزل والتي يمكن مقارنتها بأثار استخدام برامج تعديل السلوك .

استخدم أناستوبو وأخرون ( ١٩٩٣ Anastopou, et al., ) برنامجاً لتدريب الوالدين Parent Traning (pt) الذين لديهم أطفال ذوي نشاط زائد / قصور انتباه ADHD. وتكونت عينة الدراسة من أربع وثلاثين أسرة قسمت إلى مجموعتين : مجموعة تجريبية وعدد ما تسع عشرة أسرة ومجموعة ضابطة بها خمس عشرة أسرة وتقسمت المجموعة التجريبية برنامجاً في التدريب السلوكي للوالدين Perent Training(PT) من خلال لقاءات ولمدة شهرين. واشتمل البرنامج على قياسات للضغط - التوتر - قائمة السلوك للطفل - اختبارات التكيف. وأظهرت النتائج فروقاً بين المجموعتين التجريبية والضابطة وكانت لصالح المجموعة التجريبية حيث أظهرت القياسات تحسناً في خفض ضغوط الوالدين مع زيادة معدلات احترام الذات. غير أن معدلات تقارير الآباء والمدرسين عن الأطفال أظهرت تحسناً في المظاهر السلوكية للأطفال مما أدى إلى خفض النشاط الزائد / قصور الانتباه لدى الأطفال

وأكملت دراسة بير ( ١٩٩٤ Beyer ) فعالية برنامج تدريب الوالدين لباركي (Barkley) حيث أن تدريب الوالدين الذين لديهم أطفال يعانون من النشاط الزائد / قصور الانتباه يعتبر أكثر شيوعاً في علاجات هؤلاء الأطفال

. وتكونت عينة الدراسة من احدى وثلاثين سرة نديها اطفال في سن ما قبل المدرسة حتى الصف الخامس الابتدائي. وتلقت برامجاً تدريب الوالدين لمدة سبعة اسابيع حيث ثم تقسيم العينة الى مجموعتين. الاولى صابطة والثانية تجريبية واستخدمت التسهيلات المتعاونة من البرامج. واديرت الجلسات بواسطة فردين استخدما دليل باركلي لتدريب الوالدين للأطفال Barkley's Defiant Children Clinician's Manual . " For Parent Training وتم تقييم للقياسات القبلية والبعدية للعلاج في نموذج متعدد من خلال الملاحظة، وتقارير معدلات الوالدين، وتقديرات معدلات المدرسين، وأسفرت النتائج عن الآتي :

- ١ - حدوث تغير في سلوك الوالدين نتيجة التدريب .
- ٢ - وبناء على تغير سلوك الوالدين ظهر تحسن في سلوك الأطفال في المنزل بانخفاض في أعراض النشاط الزائد مع زيادة في سلوكيات الطاعة.
- ٣ - وتم الاستمرار في الوقت الإضافي للبرنامج نتيجة تغير سلوك الوالدين وسلوك أطفالهم .
- ٤ - ظهر خفض للمظاهر السلوكية للنشاط الزائد / قصور الانتباه لدى الأطفال في المدرسة.
- ٥ - ولم تجد الدراسة فروقاً دالة في التغير في السلوك، وكانت الجلسات غير كافية للتتعديل السلوكي الكامل . وتوصي الدراسة بإضافة جلسات إضافية لبرنامج باركلي لتدريب الوالدين وكذلك بالنسبة لبرنامجه في تدريب المدرسين مع مقابلات جادة في المدرسة لمعرفة حاجات هؤلاء الأطفال .

وفي دراسة تقويمية لبرنامج منظمة المحافظة على الصحة Health Maintenance Organization's (HMO) Program ذوي النشاط الزائد وقصور الانتباه ADHD والتي قام بها ريجز (Riggs, 1998) هدفت إلى

١ - تقييم الأطباء والتقارير الخاصة بالتشخيص والعلاج والتوصيات الخاصة بالأطفال ADHD .

٢ - كيفية إعلام الآباء باضطراب النشاط الزائد / قصور الانتباه لدى طفليهما .

٣ - مدى فهم الوالدان لاضطراب طفليهما بالنشاط الزائد/قصور الانتباه وتعريفهم باحتياجات العلاج .

٤ - مدى رضا الوالدين عن الرعاية التي تقدمها منظمة المحافظة على الصحة تجاه هذا الاضطراب لدى الأطفال .

اشتملت عينة الدراسة على (١٢١) فرداً من الوالدين الذين لديهم أطفال يعانون من اضطراب النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD . واستخدم الباحث المقابلة الشخصية من قبل الطبيب والممرضات لجمع المعلومات عن الرضا عن البرنامج المستخدم مع أطفال العينة. وكشفت نتائج هذا التقييم عن رضا الوالدين عن البرامج المقدمة لهم بصفة عامة، وعن برامج خفض النشاط الزائد / قصور الانتباه لدى الأطفال، وأوصت الدراسة بأن يتكرر مثل هذا العمل في عمليات التشخيص أيضاً للأطفال ذوي النشاط الزائد / قصور الانتباه .

واستخدمت المريدا (Almrida, 1998) برنامج بجمالون Py Gmalion المعرفي لتدريب الوالدين والأسرة، ولتشخيص الأطفال ذوي النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD، على عينة من الأطفال عددها (١٢٠) طفلاً من سن ٨ - ١٢ سنة ويعانون من النشاط الزائد / قصور

الانتباه ADHD . ويهدف هذا البرنامج إلى تدريب الوالدين الذين لديهم أطفال ذو نشاط زائد/ قصور انتباه ADHD للتعامل مع هؤلاء الأطفال ومساعدتهم على خفض ضغوطهم وزيادة مهاراتهم الاجتماعية في حل المشكلات . واستخدمت الدراسة نموذج بجالون المعرفي لمدة (٧) أسابيع متداخلة حيث تم تعليم وتدريب الوالدين لإعادة تشكيل السلوك وتعليمهم أسلوب حل المشكلات، والتدريب على مواقف لتنظيم السلوك الفوضوي، وتدريبهم على عمليات الاتصال الجيد وبناء المهارات الاجتماعية. ثم قام الباحث بتقييم نموذج بجالون المعرفي قبل استخدامه مع أطفال العينة ثم قام بتطبيقه وتقييمه مرة أخرى بعد تطبيق البرنامج وبعد عملية المتابعة بثلاثة أشهر على الأقل .

وأظهرت النتائج فروقاً دالة في سلوكيات الأطفال الذين يعانون من النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD خارج المنزل وفي المهارات الاجتماعية، وأظهرت أيضاً انخفاضاً في ضغوط الوالدين الذين لديهمأطفال يعانون من النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD مع زيادة إيجابية في تفاعل الطفل ذي النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD مع والديه الذين تربوا على هذا البرنامج مع خفض للمظاهر السلوكية للنشاط الزائد / قصور الانتباه .

ووضع جولدستين ( Goldstein, 1998&Goldstein, ) دليلاً لمساعدة الوالدين في التعامل مع الأطفال ذوي النشاط الزائد/ قصور الانتباه A Guide to Help Parents in Treating Their ADHD ADHD Child ويهدف هذا الدليل إلى تدريب الوالدين على كيفية التعامل مع أطفالهم الذين يعانون من النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD ويشتمل هذا الدليل على تسع استراتيجيات كالتالي :

**- الخطوة الاولى** تعلم مفهوم النشاط الزائد قصور الانتباه Learn about ADHD . وفيها يجب على الوالدين فهم ان تنظيم سلوك الأطفال ADHD وقيادةه في المنزل يتطلب معرفة دقيقة لمفهوم الاضطراب والمشكلات الناتجة، والتي تؤثر على حياة الأطفال ADHD لذلك يجب أن تكون مثابراً، ولديك القدرة على التنبؤ، وتدعم الطفل في تفاعله مع الوالدين.

**٢ - الخطوة الثانية :** "فهم عدم الكفاءة / من عدم الطاعة" Understanding Incompetence vs Non Compliance . يجب أن يفرق الوالدين بين المشاكل الناتجة من عدم الكفاءة والمشاكل الناتجة من عدم الطاعة ففي الأولى يجب أن يتعامل الوالدين مع التربية وتقوين المهارات، أما في الثانية فيجب أن يتعامل الوالدين بفاعلية مع النتائج مع الأخذ في الاعتبار أن عقاب الطفل ADHD قد يؤدي إلى شعوره بالندم والتعهد بالسلوك الحسن، ولكن تمهل قليلاً وقف لتعطي فرصة للتغيير السلوك في المستقبل .

**الخطوة الثالثة :** "أعطى تعليمات إيجابية Give Positive Directions تأكيد من إعطاء تعليمات إيجابية بدلاً من التعليمات السلبية حيث تشمل التعليمات الإيجابية على تعليمات واضحة عن ما الذي يبدأ فعله بدلاً من التركيز على ما الذي يجب إيقاف عمله أو فعله مثل (من فضلك أبدأ بواجب الرياضيات مثلاً، بدلاً من التعليمات الغامضة مثل انتبه أو أبدأ العمل) وأعلم أن طفلك يحتاج إلى أشراف وتوجيه وتنظيم لسلوكه عن الأطفال الآخرين .

**الخطوة الرابعة :** "تقديم المكافآت " Provide Ample Rewards وفيها يتم تقديم المكافآت المجزية للسلوك المناسب سواء كانت (مادية - اجتماعية) وبصفة متكررة عندما يتحسن السلوك مع تجنب التعزيز السلبي.

**الخطوة الخامسة** : تخير المواقف التي تريدها وتعزيزها ومع نجاحك السلوكيات التي لا تريدها (choose your Battles) من الضروري ان تتقدم خطوة وان تتقبل كل الصعوبات التي يمارسها طفلك والناتج عن النشاط الزائد / قصور الانتباه ويجب ان تعرر السلوك الإيجابي في الحال للسلوكيات التي لا تستطيع اهمالها ونتائج الثواب والعقاب يجب ان تنفذ بسرعة دون تأخير .

**الخطوة السادسة** : "استخدم تكتيك تكافحة الاستجابة" Use Response Techniques و يجب أن تفهم كيفية استخدام تكلفة الاستجابة وتكتيك العقاب الذي من المحتمل أن يفتقد لها .

**الخطوة السابعة** : "الخطة المناسبة" Plan Appropriately . أفهم لكى تجيب على قدرات الطفل ذو النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD بأسلوب فعال . والتاريخ الجيد للطفل معناه معرفتك الكاملة عن حاجاته (عمل تغييرات في بيئته أو تغيير الروتين - أو تكرار العمل بحيث يكون متناسقاً ، ويجب أن تكون قوانين معاملتك مع الطفل ثابتة مع تجنب المواقف أو الأنشطة التي مر بها الطفل في خبراته السابقة .

**الخطوة الثامنة** : "العقاب المناسب" Punishing Appropriately إن العقاب بمفرده لن يخفض مظاهر ADHD ولكنه يؤدي دوراً هاماً في تعديل السلوك الناتج عن عدم الطاعة .

**الخطوة التاسعة** : "ابني جزيرة من الكفاءات" Building Islands of Competence . يجب أن تعرف مناطق القوة والضعف في الطفل حتى يساعدك ذلك على التنبؤ بالخطط المستقبلية وهنا يأتي دور الصحة النفسية في التركيز على أماكن الضعف والقوة بدلاً من التركيز على أماكن الضعف فقط .

وصمم المعهد القومي للصحة النفسية ( National Institute of Mental Health 2001 ) برنامجا تدريبيا للوالدين لخفض النشاط الزائد / قصور الانتباه لدى الأطفال . ويهدف البرنامج إلى :

- ١ - تخفيف الضغوط على الوالدين للتعامل مع الطفل ذي النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD
- ٢ - إكساب الوالدين الثقة في التعامل مع الضغوط الناتجة عن مشكلات هذا الطفل وينتج عن ذلك نجاح أداء الطفل .
- ٣ - تخفيف مظاهر سلوك المخاطرة عند الطفل ذي النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD والتي تولد المشكلات الانفعالية لديه .
- ٤ - تزويد الوالدين بمعلومات عن الطفل ذي النشاط الزائد وقصور الانتباه ADHD وعن كيفية تخفيف المظاهر السلوكية المميزة لهذا الطفل .  
ويقدم هذا البرنامج لمدة ستة شهور بواقع أربع لقاءات مع الوالدين .

### **خطوات البرنامج :**

**اللقاء الأول :** التعريف بالطفل ذي النشاط الزائد " What is ADHD " من حيث :

- ١ - المظاهر السلوكية أو أعراض الاضطراب
- ٢ - تشخيص الأعراض أو المظاهر حيث يبدأ من سن (٧) سنوات ويتم التشخيص عن طريق المدرسة أو المنزل أو مكاتب الصحة الخاصة بالطفل.
- ٣ - تطبيق بعض الاختبارات السيكولوجية للتعرف على الطفل ذو النشاط الزائد وقصور الانتباه ADHD .
- ٤ - التعريف بالمشكلات التي يلاحظها الآباء مثل :  
- مشكلات الانتباه - مثل (يفقد الأشياء - ينس أحيانا)

– مشكلات خاصة بالتفكير مثل (صعوبة الانتظار – عدم تعلمه من الأخطاء.....).

– تكرار النشاط على فترات مثل (لا يحتاج إلى الراحة – غير قادر على الجلوس ...) ثم تدريبات على كل ما سبق.

**اللقاء الثاني** : "اعتن بطفلك Taking Care of Your Child" . وفي هذا اللقاء يعطي الآباء بعض الأفكار التي تساعدهم على فهم مشكلات أطفالهم الذين يعانون من النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD لكي تؤدي إلى تحسن سلوكهم وخفض مظاهره مثل :

- أ – ركز على الخبرات السابقة لطفلك مثل (مرات الإحباط – أو الفشل) .
- ب – اعرف طفلك مثل (أصعب وأسهل شيء للطفل ، وما الذي يثير انتباذه ؟ ) ثم تدريبات على ما سبق .
- ج – اتصل بطفلك مثل (قل له أنه مهم – اجعل نظرك عليه...).
- د – تعرف على أشكال السلوك مثل (علمه كيف يحل المشكلة – شجع السلوك الجيد ...)

ه – اتبع التعليمات الآتية التي أمامك بالقائمة مع استخدام عمليات التعزيز المختلفة إذا تتبع التعليمات بطريقة صحيحة ثم تدريبات على ذلك .

**اللقاء الثالث** "طفلك واضطراب النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD والمدرسة والواجبات المنزلية " School and Homework : Your Child and ADHD . وفي هذا اللقاء ركز على المشكلات الأساسية التي يسببها الطفل في المدرسة والعمل المدرسي ومصادر الضغوط على طفلك من مدرسي المدرسة ويتم في هذا اللقاء :

- ١ – الاتصال بالمعلم وهي أول خطوة للتكيف مع المدرسة، لأن المدرس هو الذي يقود أنشطة الطفل

- ٢ - العلاج الطبي وفيه يتم معرفة نوع الأدوية التي يستخدمها الطفل وأي تغيير يحدث في نظام الجرعات .
- ٣ - جدولة الواجبات المنزلية والأنشطة المدرسية . وفيها مساعدة الطفل على عمل الواجبات مع تشجيع الأداء الأحسن .
- ٤ - العمل واللعب مع الآخرين ويتم من خلاله معرفة مشاكل الطفل مع الآخرين .
- ٥ - تعليم الطفل ذي النشاط الزائد وقصور الانتباه ADHD المهارات مبكراً مثل (مهارات القراءة - الكتابة - التعرف على الأشياء الجيدة وغير الجيدة ) .
- ٦ - كيفية تنظيم الواجبات المنزلية .
- ٧ - حدد المكان المناسب لعمل الطفل في المنزل وفي المدرسة ثم تدريبات على كل ما سبق .

**اللقاء الرابع :** "أعن بنفسك" Taking Care of Your Self تعطي تعليمات أو إرشادات للأباء بالاهتمام بأنفسهم، حيث أظهرت الأبحاث أن الوالدين الذين لديهم أطفال يعانون من النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD لديهم ضغط دم عالي من مشكلات هؤلاء الأطفال، والنائنة أيضاً من سوء الخبرة في التعامل مع هذه المشكلات وكيفية التطبع معها. ووضعت قائمة لـ"كيفية العناية بالأباء"، وأظهرت نتائج هذا العمل انخفاضاً في ضغوط الوالدين مع انخفاض في المظاهر السلوكية لأطفالهم، ونجح البرنامج في إكساب الأطفال ذوي النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD سلوكيات جديدة في المنزل والمدرسة .

وفي تقرير قدمه بكم (Peckham, ٢٠٠١) عن اضطراب النشاط الزائد / قصور الانتباه والطرق غير الدوائية لتنظيم وخفض المظاهر السلوكية للأطفال الذين يعانون من هذا الاضطراب والتي تستخدم في برامج

**خفض النشاط الزائد حيث تم وضع الخطوط الرئيسية لبرامج سلوكية داخل المنزل منها :**

**أولاً :** وضع خطط للوالدين لزيادة القدرة على التحمل لمساعدة الطفل كي ينظم نفسه أو يصل إلى مستوى جيد من تنظيم النفس. بحيث يكون عطفا، صابرا ، ولديه القدرة على التعامل مع هؤلاء الأطفال، وفيما يلي بعض الخطوات التي تساعد الوالدين على ذلك :

- ١ - أن يعد الوالدان قائمة من أولويات السلوكيات السالبة لدى الطفل مثل (التشاجر - رفض الاستيقاظ مبكرا ...) ثم ترتيب السلوكيات السالبة بحيث تكون السلوكيات السلبية الأكثر تكرارا في أعلى القائمة والسلوكيات السالبة الأقل تكرارا في نهاية القائمة .
- ٢ - تأكيد من السلوكيات الغريبة والمحببة لطفلك .
- ٣ - تذكر أنه لا يوجد شخص ملاك ومن ثم تغاض عن بعض الأخطاء البسيطة لثبت حبك لأطفالك.

**ثانياً . وضع القواعد والقوانين الثابتة، مثل :**

**أ - الوفاء بالوعود بالثواب للسلوك الحسن .**

**ب - رفضك للسلوك غير الحسن .**

**ج - مرونة القوانين وأن تكون غير ضارة بالطفل، وضع في ذهنك أن الأطفال ذوي النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD لديهم صعوبات في التكيف مع أي تغيير جديد عن الأطفال العاديين .**

**ثالثاً . وضع خطط لتنظيم السلوكيات الفوضوية والتجريبية :**

- ١ - يجب أن يهتم الوالدان اهتماما بسيطا بالاضطرابات السلوكية المتوسطة التي تسمح لطاقة الطفل أن تستنفذ .
- ٢ - أعط الطفل وقتا للراحة في التحرك من مكان إلى آخر لاستنفاد الطاقة.
- ٣ - علم طفلك الإجابات اللفظية الصحيحة .

٤ - التقليل من مشاهدة المباريات التنافسية مثل ألعاب الفيديو لدى الطفل حتى يقل السلوك غير المرغوب فيه عند الطفل .

٥ - أحياناً يشتراك الوالدين دون قصد في المواقف التي تظهر السلوك الفوضوي للطفل وتتجه دون أي سبب ظاهر .

#### رابعاً . وضع نظام التعزيز :

يوضع نظام تعزيز للطفل الذي يستجيب جيداً ، فقد سجلت بعض الدراسات أن التشجيع بواسطة التعزيز المباشر لاستجابات الصحيحة أو باستخدام نموذج تكلفة الاستجابة " في هذا البرنامج يعطي الطفل التعزيز، ويسمح له أن يحتفظ به إذا استمر السلوك على الحالة الجيدة .

ووضع اقتراحات لبرنامج تعزيز مناسب للأطفال ذوي النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD كالتالي :

١ - استخدام البطاقات أو الكروت أو الدرجات أو النجوم للسلوك الجيد عندما يكمل المهام

٢ - تعزيز الطفل التي يلعب مع طفلك اللعبة المفضلة له .

٣ - يجب ألا تكرر أساليب التعزيز ( كالطعام أو الهدايا ) حتى لا تفقد أهميتها .

٤ - يجب التنويع في أساليب التعزيز .

٥ - يستجيب الأطفال بطريقة أفضل بابتسمة عندما يكون الوعيد بمكافأة في الوقت القريب أفضل من المستقبل البعيد، أي أن التعزيز الذي يعقب الاستجابة الصحيحة أفضل من التعزيز بعيد المدى . وهناك أسلوب آخر يجمع فيه الطفل نقاطاً كثيرة على سلوكيات صحيحة ويفوز في النهاية بمكافأة أو هدية كبيرة .

٦ - تجنب عدم الوفاء بالوعيد في تقديم التعزيز .

**خامساً** . وضع برنامج لتحسين التركيز والانتباه للأطفال ذوي النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD والهدف من هذا البرنامج هو تحسين القدرة على التركيز والانتباه لدى الأطفال ذوي النشاط الزائد وقصور الانتباه .  
ويستخدم البرنامج لمدة ثمانية عشر أسبوعاً بواقع مرتين أسبوعياً، يتدرّب فيها الطفل ذوي النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD على المهام السمعية والبصرية وذلك للتركيز على متابعة الانتباه باستمرار وتوزيع الانتباه على كل المهام المطلوبة وبعد نهاية ثمانية عشر أسبوعاً يصبح سلوك الطفل ذوي النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD مثل الطفل العادي . ويجب على الوالدين البحث عن الأنشطة التي تساعد الطفل على التركيز مثل لعبة " Puzzles " — ألعاب الكمبيوتر — الكلمات المتقطعة وهي من الألعاب التي تنشط العقل، وكذلك الألعاب التي تساعد على حل المشكلات مثل بعض ألعاب الكمبيوتر — السباحة — التنفس، وبعض الألعاب الرياضية التي تساعد على التركيز مثل ألعاب الكرة — الرسومات العينية والموسيقى الهدامة .

#### **سادساً** . وضع برنامج لتنظيم السلوك في المدرسة :

في حالة نجاح الوالدين في تنظيم سلوك الطفل في المنزل، فغالباً ما تظهر المشكلات في المدرسة . ومن ثم هدف هذا البرنامج إلى تحقيق السعادة والعلاقات الاجتماعية المتكاملة للطفل ذو النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD مع أصدقائه في المدرسة وتحتوي البرنامج على الآتي :  
أولاً — إعداد المعلم الذي يتعامل مع الأطفال ذوي النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD وتدريبه على استراتيجيات تنظيم السلوك لدى هؤلاء الأطفال كالتالي :

- ١ - إذا كان الطفل ذو النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD كثير التحدث. ولديه حب الظهور . فاجعل للطفل يجلس في الصف الأمامي من غرفة الصف، وهذا التكتيك يساعد على تحسين هذا السلوك .
- ٢ - إذا كان الطفل يفقد اشياءه الهامة و دائم النسيان، فالغلب على هذا السلوك يتمثل في تذكرة الطفل بصورة مستمرة .
- ٣ - يجب أن يعرف المعلم ان هذا الطفل ينسى الواجبات ويخطئ في الحل حتى يكون على وعي بقدرات هذا الطفل .
- ٤ - إذا كان الطفل لا يتحكم في الحركة أو خطه في الكتابة، أو كان ضعيفاً في استخدام الكمبيوتر؛ فإنه يمكن التغلب على هذه المشكلة بتعليم الطفل الكتابة على الكمبيوتر من الصف الثالث إلى الرابع الابتدائي .
- ٥ - وإذا كان الطفل ذو النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD لديه سلوك عدم الطاعة، فإنه يمكن أن يستجيب جيداً إلى مطالب المدرسة تحت الإشراف المباشر حيث تظهر لديهم مشاكل في الأنشطة التي لا تخضع للإشراف المباشر .

**ثانياً** - التعريف بدور الوالدين في جلوس الطفل في المدرسة يجب على الوالدين، أن يلتقا بالمدرس قبل بدء الدراسة، ويسجلوا تقريراً عن حالة طفلهما، ولنجاح ذلك يجب عمل الآتي:

- ١ - توفير العلاقات الإيجابية مع مدرس الطفل الذي يعاني من النشاط الزائد/ قصور الانتباه ADHD
- ٢ - أن يعرف الوالدان بأن المعلم يعمل مع أطفال آخرين بجاتب طفلهما ولهم مطالب تعليمية
- ٣ - كثرة المناقشات وتكرارها مع المعلم سوف توفر الوقت في جمع المعلومات عن مدى تقدم الطفل أو تأخره .

٤ - وجود مدرس خصوصي بعد المدرسة قد يساعد في حل مشكلات الطفل التعليمية .

ويقدم برنامج فولر (Fowler 2002) طرقاً حديثة لتحسين الحياة بشكل عام واحترام الذات لدى الأطفال ذوي النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD. بهدف هذا البرنامج إلى خفض المظاهر السلوكية للنشاط الزائد / قصور الانتباه، وزيادة احترام الذات، وتحسين النظرة العامة للحياة لدى الأطفال الذين لديهم هذا الاضطراب .

#### خطوات البرنامج :

**الخطوة الأولى :** "كن أكثر نشاطاً Become Proactive : وفي هذه الخطوة يتم جمع معلومات عن قدرة الطفل ذوي النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD وجوانب القوة والضعف فيها وفهم لماذا وكيف يؤثر اضطراب النشاط الزائد / قصور الانتباه في الطفل وعلى سلوكياته في المنزل، والمدرسة وموافق الحياة ونظام الأسرة بأكمله .

**الخطوة الثانية :** "غير مفاهيمك عن الطفل " : قبل أن تغير مفهوم الذات للطفل يجب أن يُغيّر الكبار وجهه نظرهم عن الطفل ذوي النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD وافصل الطفل عن سلوكه وافهم أنهم أطفال عاديون وليسوا مرضى .

**الخطوة الثالثة :** "افعل ولا تتفعل" Act, Don't React يمكن التغلب على الاستجابات الانفعالية مثل الغضب والثورة بالتوقف لحظة أو النظرة إلى شيء آخر أو الاستماع إلى الموسيقى الهدامة ثم بعد ذلك استجب لانفعالاتك، أو بأسلوب آخر عذ من ١ - ١٠ .

**الخطوة الرابعة :** "افهم طبيعة نفسك " خذ وقتاً في التفكير لنمو المهارات والهوايات واعمل برنامج تدريبات عاديًّا ومنظماً

**الخطوة الخامسة :** ابدأ بالاحسن واعط الطفل كثيرا من المدح والتشجيع المستمر والانتباه الإيجابي، واستخدم العقاب بأقل ما يمكن، ولا تسخر من الطفل .

**الخطوة السادسة :** نم إحساس الطفل بكتاعته وإحساسه بالمسؤولية، وذلك عن طريق الآتي :

١ - تعرف على نقاط القوة والضعف لدى الأطفال الذين يعانون من النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD .

٢ - نم التوقعات الحقيقية للطفل ذي النشاط الزائد / قصور الانتباه . ADHD

٣ - استخدم نقاط القوة عند الطفل في بناء فرص جديدة للنجاح في البيئة مثل :

أ - تخير عمل خاص للطفل مثل إطعام بعض طيور الزينة أو تزيين المنزل وقت الإجازة أو الأعياد

ب - اجعل لطفلك اهتمامات خاصة .

ج - أعط لطفلك أنشطة خارج المنهج الدراسي مثل الرسم - الموسيقى - الرياضة، وتخير ما يناسب طفلك.

د - العب مع طفلك، واترك له حرية اختيار اللعبة .

وبعد أن عرض البحث برامج تدريب الوالدين لخفض النشاط الزائد / قصور الانتباه لدى الأطفال العاديين ، فإنه يعرض في الجزء التالي بعض برامج تدريب الوالدين الخاصة بالأطفال غير العاديين .

ثانيا - عرض لبعض برامج تدريب الوالدين لخفض مظاهر النشاط الزائد / قصور الانتباه لدى الأطفال غير العاديين .

١ - دراسة هورن وزملائه ( Horn et.al.. 1990 ) تم التعرف فيها على برنامج التدريب السلوكي للوالدين والتدريب على ضبط الذات ومدى تأثيره

على عينة من الأطفال ذو النشاط الزائد / قصور الانتباه والمتخلفين عقلياً عددها (٤٢) طفلاً يعانون من عجز شديد في الانتباه ونشاط حركي زائد وتتراوح أعمارهم ما بين ٧ - ١١ سنة ، وتم تقسيم العينة إلى ثلاثة مجموعات تجريبية وتم استيفاء شروط تجانس العينة من حيث نسبة الذكاء ، والمستوى الاقتصادي الاجتماعي للأسرة - وعدم تناول أي أدوية - وعدم وجود عجز بدني أو أمراض نفسية .

وتلقت المجموعة الأولى برنامجاً في التدريب على الضبط الذاتي وتلقت المجموعة الثانية برنامج في التدريب السلوكي الذي يقوم به الوالدين معاً ، أما المجموعة الثالثة فقد تلقت البرنامجين معاً . برنامج الضبط الذاتي وبرنامج التدريب السلوكي للوالدين ، واستخدم الباحثون اختبار وكسلر للذكاء العملي ومقاييس كونر لتقدير سلوك الطفل . وقد حصل عليه الباحثون من تقارير المعلمين والوالدين ، وتم تشخيص العينة بالمقابلة الكلينيكية ، واستخدام معايير الدليل التشخيص الثالث للاضطرابات العقلية المعدل (DS M111 R) واستخدم برنامج الضبط الذاتي الذي يعتمد على أسلوب تقديم التعليمات للذات في جلسات تدريبية لمدة شهر ونصف تقريباً . وزمن كل جلسة حوالي ٣٥ - ٤٥ دقيقة بالإضافة إلى جلسات إضافية للتقدير النهائي .

كما استخدم برنامج التدريب السلوكي للوالدين وكيفية استخدامهم لعمليات التعزيز المختلفة في تعزيز السلوكيات الصحيحة لمدة شهر ونصف تقريباً . وبعد انتهاء المدة المحددة للبرنامجين أجريت التحليلات الإحصائية وأظهرت النتائج الآتى :

- ١ - وجود فروق دالة احصائياً في تقدير الوالدين لسلوك الأطفال قبل وبعد تلقي البرنامج العلاجي

٢ - عدم وجود فروق دالة إحصانياً في تقدير المعلمين لسلوك الأطفال في المجموعات التجريبية الثلاث قبل وبعد تلقي البرنامج العلاجي .

٣ - وجدت فروق دالة إحصانياً بين المجموعة التجريبية الثالثة التي تلقت برنامجين معاً والمجموعتين التجريبيتين الأولى والثانية وكانت لصالح المجموعة التجريبية الثالثة التي تلقت البرنامجين العلاجيين معاً، وهذا يدل على مدى فاعلية ضم البرنامجين معاً (برنامج التدريب السلوكي للوالدين وبرنامج ضبط الذات) في تخفيض وعلاج مظاهر النشاط الزائد / قصور الانتباه لدى الأطفال المختلفين عقلياً .

#### تعقيب :

ركزت البرامج المقدمة لتدريب الوالدين على أهمية الدور الهام الذي يؤدونه في مساعدة أطفالهم ذوي النشاط الزائد / قصور الانتباه، حيث أنهما أقرب الأفراد للطفل وأكثراهم تأثيراً وتأثراً به، غير أن العمل مع أفراد الأسرة لاكتساب مهارات جديدة في أساليب التعامل وال العلاقات الأسرية بهؤلاء الأطفال تفيد في خفض ضغوط الوالدين التي تنشأ نتيجة عدم فهم حاجات هؤلاء الأطفال.

وتُدرب هذه البرامج الوالدين على كيفية التعامل مع سلوك الطفل ذي النشاط الزائد / قصور الانتباه المصحوب بالاندفاعية بصبر وحكمة، ومع سلوك عدم الطاعة بالدفع واللين، وتدريلهم على كيفية وضع نتائج متوقعة للسلوك مع تطبيق هذه النتائج في الحال، وأيضاً يتم تدريبلهم على تنظيم السلوك بدلاً من العقاب، وتحديد المشاعر وردود الأفعال، والتدخل الفوري عندما يُسيء الطفل السلوك .

ويتم تدريب الوالدين في هذه البرامج أيضا على الاستراتيجيات التي تشجع على السلوك الإيجابي للطفل ذي النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD والأساليب التي تقلل من السلوك غير المرغوب فيه مثل :

- التعرف على السلوك الإيجابي وتدعمه بصورة مستمرة .
- التركيز على تشجيع بعض السلوكيات الإيجابية وقت حدوثها .
- تكليف الطفل ذي النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD ببعض المهام ليقوم بعملها في المنزل .
- مساعدة الطفل على تنظيم النشاط باستخدام وسائل تعليمية مثل عمل جداول - خرائط - رسم .
- جعل الطفل يركز أثناء حديثك معه وأثناء تلقينك للإرشادات الخاصة به .
- إعطاء الثقة للطفل مع استمرارية التحكم في المواقف السلوكية .
- من الحكمة أن يحترم الوالدان الطفل ولا يهيناه أمام الآخرين .

وكل ما سبق ذكره، إذا تحقق بنجاح فسوف يؤدي إلى خفض مظاهر النشاط الزائد / قصور الانتباه لدى الأطفال . حيث أوصى تود ( ١٩٩٧ Todd ) بتعليم برامج تدريب الوالدين الذين لديهم أطفال ذوو نشاط زائد / قصور انتباه ADHD ، حيث قام بتقديم شامل لنتائج الدراسات التي استخدمت هذه البرامج لما لها من تأثير جيد في الإجابة عن أسئلة الكثير من الأسر تجاه أبنائهم، ووجد أنها من أحسن البرامج التي تستخدم لخفض مظاهر النشاط الزائد / قصور الانتباه لدى الأطفال في المنزل والمدرسة .

**الفصل السادس**

**برامج متعددة النماذج**

## الفصل السادس — برامج متعددة النماذج :

ويتضمن هذا المحور عرضاً موجزًّا لأبرز البرامج والدراسات الحديثة التي أسهمت في خفض مظاهر النشاط الزائد / قصور الانتباه لدى الأطفال باستخدام النماذج المتعددة .

### Treatment For Children

وفي هذا المجال تناولت دراسة جولدابير (Gold Haber, 1991) برنامجاً متعدد النماذج في فترة الصيف يومياً للأطفال ذوي النشاط الزائد / قصور الانتباه، حيث اشتراك في هذا البرنامج (ثمانية) أطفال يعانون من النشاط الزائد / قصور الانتباه. تلقوا برنامجاً علاجياً صيفياً مكثفاً يومياً Summer Day Treatment Program (STP) لمدة ثمانية أسابيع من الجلسات في العلاج السلوكي والعلاج الطبي معاً، ويعتمد في منهجه على العلاج المتمرکز على الطفل بواقع تسع ساعات يومياً لمدة خمسة أيام في الأسبوع .

ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين السلوك الاجتماعي والمهارات الرياضية . واستخدام التداللات السلوكية مثل التعزيزات الخاصة لكل طفل وكيفية استخدام تكتيك الحرمان لبعض الوقت والتدريم الاجتماعي، وأسلوب النمذجة، وأسلوب حل المشكلات والتدريب على المهارات الاجتماعية . وأنشاء تطبيق البرنامج حدث تحسن في سلوك الأطفال، وانخفضت المظاهر السلوكية للنشاط الزائد / قصور الانتباه وزاد احترام الذات . وبعد انتهاء البرنامج واستخلاص النتائج، قام الباحث بعمل تقييم نهائي للبرنامج من قبل الوالدين تجاه هذا البرنامج وتجاه أطفالهم فوجد اتجاهها إيجابياً يؤيد فاعلية هذا البرنامج في خفض النشاط الزائد / قصور الانتباه لدى الأطفال .

وحاول بلهام وآخرون (Pelham. et.al 1992) استخدام البرنامج العلاجي اليومي الصيفي المكثف (STP) لخفض النشاط الزائد

قصور الانتباه ADHD. وقام بإجراء تجربة على ثمانية وعشرين طفلاً في سن ٧.٢ - ١٣.٨ سنة من الذكور يعانون من النشاط الزائد / قصور الانتباه وتلقت علاجاً مزدوجاً تبادلياً من عقار بلاسيبو المعياري الضابط ومركيبات المثيل فينيدات في جلسات البرنامج . وأظهرت نتيجة هذه التجربة تحسناً في سلوك الأطفال الذين عولجوا بمركيبات المثيل فينيدات، وتحسناً في الأداء . وفي التجربة الثانية تكونت من ثمانية وثلاثين طفلاً في سن ٧.٢ - ١٣.٨ سنة يعانون أيضاً من النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD من الذكور وتمت المعالجة بعقار آخر بدلاً من عقار بلاسيبو وتمت الإجراءات مثل التجربة الأولى تماماً من خلال البرنامج العلاجي الصيفي اليومي المكثف (STP) وأشارت النتائج إلى وجود فروق في التأثيرات الدوائية حيث ظهر نجاح التقويم باستخدام عقار بلاسيبو مقابل المثيل فينيدات مع الذكور الذين يعانون من النشاط الزائد وقصور الانتباه .

وتهدف دراسة كارلسون وأخرون (Carlson, et. al., 1992) إلى معرفة تأثير العلاج الفردي والمشترك مع المثيل فينيدات والعلاج السلوكي على أداء الطفل ذي النشاط الزائد / قصور الانتباه (ADHD) داخل غرفة الصف . واشتملت الدراسة على (أربعة وعشرين) طفلاً من الذكور ممن يتراوح أعمارهم ما بين ٦ - ٢٢ سنة ويعانون من اضطراب النشاط الزائد / قصور الانتباه واشتركون في برنامج علاجي لمدة (ثمانية) أسابيع، تلقى فيه كل طفل علاج بعقار بلاسيبو وجرعتين من مركيبات المثيل فينيدات ٣٠ مم / كجم ، ٦٠ / كجم بالتبادل بالإضافة إلى جلستين داخل غرفة الصف أحدهما : في تعديل السلوك (BM) باستخدام التعزيز الإيجابي مع تكلفه الاستجابة أسلوب Token Economy والتعزيز بزيادة وقت الراحة . Time-out مع كتابة التقارير اليومية من قبل الوالدين في المنزل . والثانية: استخدام نفس الأساليب السابقة بالإضافة إلى الملاحظة الدقيقة

داخل غرفة الصف في في المهام المسندة لطفل والسنوات اللاسو و مدى دقة العمل المدرسي و درجه اتمامه بالإضافة الى تقرير يومي عن ادائه ومعدلات الذات للطفل

واثبتت النتائج تحسناً في السلوك بالعلاج الطبي (MPH) والعلاج السلوكي (BM) وكذلك تقدماً أكاديمياً في الأداء مع الدقة في العمل العلاج السلوكي الفردي حيث كانت نسبة الجرعة ٣٠ ملجم / كجم من مركبات المثيل فينيدات. ووجد الباحثون تحسناً في السلوك داخل غرفة الصف بالعلاج المختلط من العلاج السلوكي والعلاج الطبي بنسبة ٣٠ ملجم / كجم مثيل فينيدات، حيث كان أفضل من العلاج الطبي وحده بمركبات المثيل فينيدات ذات الجرعة العالية بنسبة ٦٠ مجم كجم / كجم .

وفحصت دراسة هل وكاتاريا ( Kataria 1992&Hall ) تأثير نوعين من تكتيكات العلاج الطبي مع التدخلات المعرفية على عينة من الأطفال واحد وعشرين طفلاً من سن ٦ - ١٢ سنة تم تشخيصهم على أنهم يعانون من اضطراب النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD وتمت المقارنة بين ثلاثة مجموعات . المجموعة الأولى ضابطة لم تلق أي نوع من العلاج، والمجموعة الثانية تلقت علاجاً ببرنامج تعديل السلوك، والمجموعة الثالثة تلقت برنامجاً في التدريبي المعرفي: واستخدم الباحثان نوعين من الأدوية المنبهة أثناء الجلسات الثانية والثالثة. وأظهرت النتائج أن اشتراك العلاج الطبي مع التدخل المعرفي يومياً يحسن من استجابات الأطفال ذوي النشاط الزائد / قصور الانتباه ومن سلوك الاندفاعية . ولا توجد فروق دالة بين المجموعات التي تلقت برنامج تعديل السلوك والأخرى التي تلقت العلاج المعرفي. ولكن ظهر تحسناً لدى أطفال المجموعة التجريبية أكثر من أطفال المجموعة الضابطة

اما دراسة بلهام وآخرين (Pelham. et al 1992) فقد أجريت لتقدير تجربة للفصل بين تأثير برنامج تعديل السلوك باستخدام جرعتين من عقار مركبات المثيل فينيدات (٣ .٦ .٠ ملجم / كجم) مقارنة مع مجموعة لم تتلق برنامجاً في تعديل السلوك مع المعالجة بعقار بلاسبو وأجريت التجربة على واحد وثلاثين طفلاً يعانون من النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD من الذكور حضروا برنامج العلاج الصيفي المكثف (STP) . أظهرت نتائج التقييم أن العلاج الدوائي بالجرعة العالية أكثر من الضعف أظهرت تحسناً في السلوك مع خفض مظاهر النشاط الزائد لدى الأطفال أكثر من العلاج السلوكي وتعديل السلوك بمفرده .

وأجرى كوفي ( Coffey, 1993 ) دراسته في أسلوب عمل تعاوني ناجح باستخدام الأساليب الدوائية وبعض أنواع أساليب العلاج السلوكي على أربعة وعشرين طفلاً لديهم نشاط زائد / قصور انتباه ADHD وتم اختيارهم طبقاً لمعايير DSM4 بشرط أن تكون العينة خالية من الأمراض العصبية أو النفسية . ثم تتبع الباحث نظام دوائي خاص من الأدوية المنبهة مثل مركبات المثيل فينيدات على العينة طبقاً ببرنامجه الذي استخدم فيه أسلوب العمل التعاوني على الأطفال العاديين والأطفال ذوي النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD في بعض الأنشطة التي تنمي إلى مهارات تركيز الانتباه، ومهارات حل المشكلات، مهارات التحكم في الاستجابات، مهارات التحدث للذات أثناء أداء مهمة عقلية والتي تتطلب مهارة تركيز الانتباه ومهارات حل المشكلة . وأسفرت النتائج عن فاعلية هذا البرنامج التعاوني في خفض مظاهر النشاط الزائد وتنمية هذه المهارات السابق ذكرها لدى الأطفال ذوي النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD .

واهتمت دراسة مكوني (Mc Cone 1993) بالعلاجات المتعددة التي تشمل على العلاج بالأدوية المنبهة أو المنشطة والتدخلات السلوكية

لخفض المظاهر السلوكية للنشاط الزائد ، قصور الانتباه ADHD . وتهدف الدراسة إلى توصيغ نوعين من العلاج في حالة فصلهما عن بعض وفي حالة اشتراكهما معاً لخفض سلوك النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD لدى الأطفال. واستخدمت الدراسة برنامج تنظيم السلوك الفوضوي وغير المتوقع، وبرنامجاً آخر طبياً، استخدمت فيه الأدوية المنشطة أو المنبهة . واشتملت عينة الدراسة على خمسة أطفال ذكور من سن ١١-٧ يعانون من النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD حيث تلقوا علاجاً لمدة ستة عشر يوماً بواسطة برنامج علاجي صيفي يومي Summer day Treatment Program (SPTP) وبرنامج تنظيم السلوك Contingency Program حيث كان البرنامج المتعدد يهدف إلى حل مشكلة سلوكية واحدة فقط لكل طفل . واستخدم في البرنامج أسلوب التعزيز الإيجابي مع تكلفه الاستجابة Token Economy في البرنامج الصيفي وذلك بالتبادل مع العلاج الطبي بعقار بلاكسبيو. ونجح هذا البرنامج في تحسين سلوك الأطفال تجاه أربعة مواقف علاجية، حيث أظهرت النتائج الآتي .

- ١ - أثرت البرامج الطبية تأثيراً معيناً لكل العينة أكثر من برنامج تنظيم السلوكيات المتوقعة.
- ٢ - اشتراك التدخلات الطبية والعلاج السلوكي معاً جعلت النتائج تنحو نحو المعدل الطبيعي في خفض النشاط الزائد .
- ٣ - أن العلاج الطبيعي بالتبادل مع نوعين من الأدوية أعطى نتائج أفضل من العلاج بعقار واحد فقط .
- ٤ - أن اشتراك التدخلات الطبية والسلوكية معاً أعطت نتائج أكثر فائدة من العلاج الطبيعي وحده، أو العلاج السلوكي بمفرده، وأوصت الدراسة

باستخدام هذا التصميم الفريث من نوعه وهو برنامج "متعدد النماذج" في مواقف علاجية أخرى .

وصمم أنتار (Antar, ١٩٩٤) برنامجا متعدد النماذج للتدخلات التربوية في المدرسة. ويهدف هذا البرنامج إلى الآتي:

- ١ - تنمية التحكم الذاتي .
- ٢ - تنمية مهارات حل المشكلة .
- ٣ - المساعدة في تحسين السلوك .
- ٤ - تحسين الأداء الأكاديمي .

٥ - تقوية أو تدعيم عمليات التعلم وانتقال تأثيراته التابعة له .

ويحتوي هذا البرنامج على أساليب تدريبية وخدمات تدعيمية للتلاميذ والمدرسین، وبرنامج متابعة وتقويم لتحديد الكفاءة . واستخدمت التدخلات التقويمية القبلية والبعدية على عينة من الأطفال الذين يعانون من اضطراب النشاط الزائد/ قصور الانتباھ ADHD من سن ٦ - ١٢ سنة لتقويم درجة الانتباھ، والتحكم في الذات، ومفهوم الذات، وكفاءة الأداء الأكاديمي لهؤلاء الأطفال . وأظهرت النتائج مدى فاعلية هذا البرنامج في خفض المظاهر السلوكية للنشاط الزائد. حيث إن هذا البرنامج يحتوي على نماذج تربوية لم يشتمل عليها أي برنامج في ذلك الوقت .

وفي دراسة كشفية لمعرفة أي من البرامج العلاجية متعددة النماذج أكثر تأثيراً في تحسين سلوك الأطفال الذين يعانون من النشاط الزائد / قصور الانتباھ ADHD، أجري هوفنگ (Hoving, ١٩٩٦) دراسة على عينة مكونة من (٤٥) طفلاً يعانون من اضطراب النشاط الزائد/ قصور الانتباھ (ADHD) واستخدم ثلاثة أنواع من البرامج هي :

- ١ - برامج العلاج الفردي .
- ٢ - برامج العلاج الأسري .

### ٣ - برامج العلاج الطبي .

واستخدم استبيان للمواقف المنزلية لجمع معلومات عن هذه البرامج، ومدى تأثيرها على سلوك النشاط الزائد للأطفال وأوضحت النتائج ما يلى :

- ١ - وجود علاقة إرتباطية سالبة بين العلاج التعاوني المكون من (برامج العلاج الفردي، العلاج الأسري والعلاج الطبي) مع المواقف التي تحدث فيها المشكلات السلوكية داخل المنزل .
- ٢ - وجود علاقة إرتباطية موجبة بين العلاج التعاوني المكون من (العلاج الفردي والعلاج الأسري) فقط مع عدد من المواقف التي يحدث فيها المشكلات السلوكية داخل المنزل .

وتناولت دراسة بيانكو (Bianco ١٩٩٧) تصميما جديدا لبرنامج نفسي تربوي متعدد النماذج يهدف إلى تدريب الوالدين والمدرسين الذين لديهم أطفال في مدارس الحضانة أو المدارس الابتدائية. وتم تشخيصهم على أنهم يعانون من اضطراب النشاط الزائد / قصور الانتباه (ADHD)، وتدريب الأخصائيين النفسيين في المدرسة وذلك لزيادة المعرفة لديهم بنوعية هؤلاء الأطفال، وزيادة مهارات الاتصال معهم لخفض سلوك النشاط الزائد . وقام بتطبيق البرنامج على عينة من الوالدين والمدرسين الذين لديهم أطفال يعانون من النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD، أو يتعاملون معهم عن طريق مباشر أو غير مباشر، وتراوحت مدة البرنامج أثنتي عشر أسبوعا، تم فيها التدريب على هذا البرنامج متعدد النماذج المشترك المكون من اختبارات تقييمية ونموذج للملاحظة المنظمة بغرفة الصف يقوم بها الأخصائي النفسي في المدرسة مع مقابلات شخصية للوالدين لجمع معلومات عن الطفل في استماراة مقابلة شخصية، كما قام

باستخدام المقابلة الشخصية للاتصال بين الوالدين والطفل، وكذلك اختبار التكيف الزوجي للوالدين، وتتضمن تنفيذ البرنامج الآتي :

— قام بإجراء إحدى عشرة جلسة مباشرة خاصة بالتدريب على التعلم باللحظة وأسلوب النمذجة ولعب الأدوار وإعادة التجربة والمحاضرات والواجبات المنزلية والتغذية الرجعية . وإنماء المعرفة والمعلومات والمهارات للتعامل مع طبيعة الطفل .

— قام بتدريب المرشدين في المدرسة والوالدين على تكنيك خاص بتنظيم السلوك وتدريب المدرسين في تنمية معارفهم عن هؤلاء الأطفال الذين يعانون من النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD داخل غرفة الصف كما استخدم تكنيك تنظيم السلوكيات الخاصة بهذا الطفل.

— أسفرت النتائج عن اتجاهات إيجابية للوالدين نحو هذا البرنامج وفي خصائص سلوك الأطفال ذوي النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD حيث ظهر خفض المظاهر السلوكية التي تميز بالنشاط الزائد / قصور الانتباه . وأخيراً تم تطوير البرنامج من خلال نتائج هذه الدراسة وأصبح من أهم أهدافه العلاجية هو كيفية تعليم الوالدين والمدرسين طرق التطبيع مع السلوك أو كيفية تعديله .

وتهدف دراسة الأكاديمية الأمريكية في الطب النفسي للأطفال والمرأهقين ( American Academy of Child and Adolescent ) إلى وصف ملامح الممارسات الكيلينيكية في تحديد وتشخيص وعلاج الأطفال والمرأهقين الذين يعانون من النشاط الزائد / قصور الانتباه ( ADHD ) وأشتمل الوصف على الآتي :

١ - برنامج المقابلات الكيلينيكية مع الطفل والديه مع مراجعة شاملة للمحاضرات العلمية والإرشادات الكيلينيكية والمعدلات المعيارية للوالدين والمعلمين . وعادة ما يتطلب استخدام اختبار الذكاء واختبار تحصيل أكاديمي

حيث تعتمد هذه الدراسة على دعم وتعليم الوالدين - الوضع المدرسي المناسب - العلاج الطبي (الدوائي النفسي المناسب) . هذا بالإضافة إلى وصف للمعالجات الأخرى التي تضم تعديل السلوك والإرشادات المدرسية والأسرية لمجموعة المعالجين الذين سوف يتعاملون مع سلوكيات هذا الطفل .

٢ - تحديد نقاط الضعف والقوة في الأطفال ذوي النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD، والأسرة والمدرسة والمجتمع المحيط بالطفل وذلك لتحديد أو اختيار الاستراتيجيات الخاصة بالعلاج والتي تضم أيضاً الوالدين والمهنيين في المدرسة لمناقشة بدائل العلاج وإقامة علاج تعاوني بين الوالدين والأطفال والمدرسة لتنفيذ طرق العلاج بشكل متسق مما قد يتطلب إجراء جلسات علاجية مع الفرد والأسرة، الوالدين والمرشد المدرسي .

وتوصلت نتائج الدراسة الآتي :

- ١ - يجب أن تكون هناك خطط للعلاج الفردي طبقاً لكل نمط من أنماط الأعراض أو مظاهر النشاط الزائد والقوى التي تم تحديدها في التقييم .
- ٢ - تختلف الأساليب العلاجية طبقاً لنوعية الأعراض فمثلاً أعراض ضعف الانتباه - الاندفاعية النشاط الحركي المفرط من المحتمل أن يفيد العلاج الطبيعي في علاجه .

والأعراض السلوكيّة اللاتكيفية وغير المقبولة من المحتمل أن يفيد في علاجها التعديل البيئي. أما مظاهر نقص المهارات في المجالات الأكاديمية والاجتماعية تتطلب علاجاً محدداً لا يستجيب للأدوية أو التعديل السلوكي بل يتواافق في المدارس والمناهج التعليمية الملائمة .

- ٣ - قد يكون العلاج النفسي إضافي ومتطلب لعلاج المشكلات النفسية الناشئة من اضطراب النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD .

٤ - أما الحالات المزمنة فتتطلب بينة مركبة من العلاج الطبي وال النفسي الاجتماعي .

وفحصت دراسة فرانكل وأخرين (Frankel, et. al., 1997) تعميم برنامج التدريب على المهارات الاجتماعية عندما يتعامل الوالدان مع المهارات المناسبة لأطفالهم الذين يعانون من النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD، في التكيف الاجتماعي . وتم فحص (٣٥) طفلاً تتراوح أعمارهم ما بين ٩,٦ - ١٢,٩ سنة يعانون من النشاط الزائد / قصور الانتباه و(١٧) طفلاً عادياً ليس لديهم نشاط زائد وجميع أطفال العينة تلقوا علاجاً بالأدوية المنشطة وقسمت العينة إلى أربع مجموعات : المجموعة الأولى بها (١٦) طفلاً يعانون من النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD، كمجموعة تجريبية والمجموعة الثانية بها (١٢) طفلاً بدون ADHD ، كمجموعة انتظار والمجموعة الثالثة بها (١٩) طفلاً يعانون من اضطرابات سلوكية في النشاط الزائد/ قصور ADHD المصحوب بتشتت الانتباه ، كمجموعة تجريبية . والمجموعة الرابعة بها خمسة أطفال ليس لديهم اضطرابات أي دون النشاط الزائد / قصور الانتباه (ADHD)، كمجموعة انتظار. وطبق على العينة برنامج التدريب على المهارات الاجتماعية بجانب البرنامج الطبي .

وأظهرت النتائج تحسناً في خفض سلوك النشاط الزائد لدى المجموعات التي بها أطفال يعانون من النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD مقارنة بالمجموعات التي بها أطفال لا يعانون من النشاط الزائد . كما أظهرت أيضاً أن مجموعة الأطفال الذين يعانون من النشاط الزائد / قصور الانتباه بقصور الانتباه ADHD فقد تحسن انتباهم بنسبة ٨٣,٤ % بالمقارنة بالأطفال الذين ليس لديهم اضطراب قصور الانتباه . غير أن المجموعة التي بها أطفال ذوو نشاط زائد / قصور انتباه ADHD أظهرت تحسناً كبيرة نتيجة

اشتراك ببرنامج التدريب على المهارات الاجتماعية على أنفسهم وعلى والديهم مع البرنامج الطبي والأدوية المنبهة .

وفي دراسة مقارنة أجرتها سميث وأخرون ( Smith, et. al.. 1998) عن تأثير الأدوية المنشطة والعلاج السلوكي في خفض مظاهر النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD، لدى الأطفال ثم أجريت دراسة تتبعية لحوالي ١٦ طفلاً يعانون من النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD اشتراكوا في تجربة لبرنامج مزدوج من عقار المثيل فينيدات وعقار بلاسيبو بجرعة مقدارها ٣٠ ملجم / كجم أثناء تطبيق برنامجين للعلاج الصيفي اليومي المكثف (SPT) .

وتم تطبيق هذه البرامج المتعددة على الأطفال ذوي النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD من سن ٨ - ١١ وعلى المراهقين من سن ١٢ - ١٤ سنة . ثم قسمت معدلات الكفاءة التعليمية والسلوك الاجتماعي بواسطة المرشدين والمدرسين في (١٢) متغير منهم (٣) متغيرات اظهرت فروق إحصائية دالة في حجم تأثير هذه العقاقير عند الأطفال والمراهقين . غير أن النتائج أظهرت أن الأدوية المنشطة أو المنبهة لها تأثير متساوي عند الأطفال والمراهقين ذوي النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD إذا ارتبطت بنفس الأنشطة .

واهتمت دراسة واشن بوش وآخرين ( Wasch busch et. al . 1998) بتعزيز العلاج السلوكي والعلاج بالأدوية المنبهة للأطفال ذوي النشاط الزائد / قصور الانتباه . حيث قام الباحثون بفحص الفروق الفردية في الاستجابات الشائعة والناتجة عن هذين العلاجين بحيث أدخلهما الباحثون في البرنامج العلاجي الصيفي اليومي الذي طبق على عينة من ثلاثة ذكور تتراوح أعمارهم ما بين ٨ - ٩ سنوات تلقوا البرنامج العلاجي الصيفي اليومي المكثف والذي يتضمن العلاج السلوكي والعلاج الطبي معاً .

وأظهرت النتائج أن طفلاً واحداً فقط عمره ثمان سنوات استجاب للعلاج الطبي، وتحسن لديه المظاهر السلوكية للنشاط الزائد / قصور الانتباه، أما الطفل الثاني في العمر نفسه فقد أظهر استجابة للعابجين معاً (العلاج السلوكي مع العلاج الطبيعي) والطفل الثالث والأخير تسع سنوات أظهر استجابات مختلفة في العلاج طبقاً لنوعية العلاج . هذا يؤكد مبدأ الفروق الفردية في الاستجابة لعلاج الأطفال ذوي النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD.

وأجرى المعهد القومي للصحة النفسية (National Institute of Mental Health 1999) أكبر دراسة بالتعاون مع العديد من الباحثين لخفض النشاط الزائد / قصور الانتباه لدى الأطفال، وبغرض المقارنة بين برامج العلاج الطبيعي وبرامج العلاج السلوكي للأطفال ذوي النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD واشتملت عينة الدراسة على (٥٧٩) طفلاً يعانون من النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD تتراوح أعمارهم ما بين ٩ - ١٢ سنة، في المدرسة الابتدائية من الصف الأولى حتى الرابع . وتطابقت العينة مع معايير DSM4 حيث كان النمط المركب أو المختلط من النشاط الزائد وقصور الانتباه ADHD هو النمط الشائع، حيث ظهرت الأعراض السلوكية في ستة شهور الأخيرة قبل تطبيق الدراسة . وبعد التعرف على الأطفال وتشخيصهم تم تقسيم لعينة إلى أربع مجموعات :

- المجموعة الأولى تلقت برنامجاً في العلاج الطبيعي .
- المجموعة الثانية تلقت برنامجاً في العلاج السلوكي .
- المجموعة الثالثة تلقت البرنامجين معاً الطبيعي والسلوكي .
- المجموعة الرابعة "ضابطة" .

وأجريت على العينة أربع أنواع من البرامج العلاجية هي :

١ - البرنامج العلاجي الطبي لجرين هل وزملائه ( Green hill, et. al. ) 1996 .

٢ - البرنامج السلوكي المطور لبلهام ( Pelham, 1996 ) .

٣ - برنامج التداللات المدرسية ( Pelham, et.al., 1998 ) .

٤ - البرنامج المشترك الشامل الذي يجمع البرامج الثلاث السابقة.

واستمرت المعالجة بهذه البرامج لمدة أربعة عشر شهرا، ثم بعد ذلك أجرى برنامج للمتابعة الدورية لتقويم النتائج والتحقق من صحتها . واشتملت البرامج العلاجية لخفض النشاط الزائد على الآتي:

أولاً - البرنامج الطبي ( Green hill et.al .. 1996 ) : تكونت العينة من ( ٢٨٩ ) طفلاً منهم ( ٤٤ ) تلقوا علاجاً بعقار ( الريتالين )، ( ١٤٥ ) طفلاً تلقوا علاجاً من عقار ( الدكسترين )، ( ١٨ ) طفلاً لم يتلقوا علاجاً طبياً، ( ١٧ ) طفلاً رفضوا العلاج الطبيعي، و طفل واحد فقط استبعد لظروف صحية، بالإضافة إلى ( ١٥ ) طفلاً بدأوا العلاج ولم يتموه أثناء فترة المعالجة للأسباب الآتية ( ٤ ) منهم حدث لهم تأثيرات جانبية و ( ٧ ) آخرون استبعدوا لصعوبة الإجراءات، ( ٤ ) آخرون لم تتوفر عنهم أي معلومات، وأصبحت العينة ( ٢٥٦ ) طفلاً عن المجموع الكلي ( ٢٨٩ ) طفلاً، حيث تلقوا العلاج الطبيعي لمدة ( ٢٨ ) يوماً استخدم فيها عقار " الريتالين " بجرعات متفاوتة من ٥ - ١٠ - ١٥ - ٢٠ ملجم / كجم وأعطيت معها وجبة إفطار ووجبة غداء . وأعطي عقار الدكسدين والبيمولين ومن أجل تحسين التكيف سمح للأطباء بإعطاء ١٠ ملجم من الجرعة الدوائية بالزيادة أو النقصان حسب الحاجة، تم حدد ١/٢ ساعة شهرياً للمتابعة وزيارة الطبيب لمعرفة مدى التقدم في سلوك الطفل لأكثر من شهر من تقارير الوالدين والمدرسين .

واسفرت النتائج بعد اربعة عشر شهرا من العلاج عن الآتي :

- ١ - خفض البرنامج النشاط الزائد / قصور الانتباه لدى الأطفال بنسبة ٤٧% من الأطفال الذين تلقوا علاجاً بعقار الريتالين "Retalin"
- ٢ - تحسنت أعراض النشاط الزائد لدى ١٠ % من العينة التي عولجت بعقار الدكستروامفيتامين "Dextroamphetamine".
- ٣ - ظهر تحسن في الأعراض بنسبة ١% فقط للأطفال الذين عولجوا بعقار البيمولين "Pemoline".

ثم أجري اختبار للآثار الجانبية فوجدوا أن حوالي ٨٥% من العينة لا يوجد لديهم أي آثار جانبية وإن وجدت في بعض الحالات فهي صورة خفيفة جداً.

ثانياً: البرنامج العلاجي السلوكي بهام وهوزا ( &Pelham, Hoza. 1996) واشتمل البرنامج على الآتي :

- ١ - التداللات الوالدية : منها برنامج تدريب الوالدين Parent Training واشتمل على سبع وعشرين مجموعة من الجلسات كل مجموعة بها ست أسر لديها أطفال يعانون من النشاط الزائد/ قصور الانتباه ADHD، تلقوا ثماني جلسات فردية لكل أسرة أسبوعياً . ويقوم المعالج بنفسه بعمل التدريبات للوالدين حيث كان التركيز على تعليم الوالدين الاستراتيجيات الخاصة على كيفية التعامل مع أطفالهم ، وتشجيعهم .
- ٢ - العلاج المتمرکز على الطفل . ويسمى برنامج العلاج الصيفي (STP) Summer Treatment Program والذي تم تطويره بواسطة بهام (Pelham 1996) واشتمل هذا البرنامج على العلاج في فترة الصيف بصورة مكثفة على أن يحضر الطفل ثمانية أسابيع بواقع خمسة أيام في الأسبوع خلال فترة الصيف ولمدة تسع ساعات يومياً ويقوم بتطبيقه المرشدون والمعالجون السلوكيون والوالدن المدربان على هذا البرنامج .

ويحدد لكل مرشد حالة واحدة من أثنتي عشرة أسرة. ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين السلوك الاجتماعي، ووضع هذا البرنامج أساساً للطفل الذي يحتمل أن يغير التعزيز من قدراته إلى الأحسن مع وضع التوقعات للسلوك والتدريب على المهارات الاجتماعية مع نماذج خاصة تعليمية تساعده في خفض مظاهر النشاط الزائد / قصور الانتباه لدى الطفل .

٣ - التدخلات المدرسية School Based Treatment لبلهام وآخرين (Pelham, et. al. 1998) ويركز هذا البرنامج على عنصرين أساسيين :  
- المعلم أو المرشد لتنظيم السلوك داخل الفصل ويتم ذلك خلال ١٦ جلسة أسبوعيا.

- تجهيز الوسائل الأولية المتخصصة التي تعمل مباشرة في غرفة الصف مع الطفل خلال العام الدراسي، ويتم ذلك في عمل نصف يومي لمدة اثنى عشر أسبوعاً لمدة ستين يوماً دراسياً، يتم فيه التدريب السلوكي مرة إلى مرتين لتسجيل الوسائل الأولية المتخصصة في بطاقة خاصة بالطفل، وكتابة تقرير يومي عن سلوكياته في المدرسة والمنزل . وتكميل التقارير عن مدى نجاح الطفل في السلوكيات الخاصة، وهذه البطاقة تُرسل إلى المنزل يومياً بواسطة التلميذ حتى يحصل على التعزيز من الوالدين لهذه النجاحات اليومية في سلوكه. وتستمر هذه الطريقة لمدة أربعة عشر شهراً لك كل الحالات حيث تخضع سلوكيات النشاط الزائد كل شهر إلى أن تنتهي هذه الأعراض بنهاية الفترة الدورية وهي أربعة عشر شهراً .

ثالثاً : برنامج العلاج المشترك Combined Treatment . وهو يشتمل على الإشراف الفردي على سلوكيات الطفل ببرنامج العلاج السلوكي والعلاج الطبي باستخدام الأدوية التي ثبت فعاليتها في خفض النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD لدى الأطفال. حيث يبدأ الطفل بالجرعة الأقل يومياً من مركبات المثيل فينيدات حيث يكون متوسط الجرعة (٣١,٢) ملجم /


كجم يومياً للمجموعة الشاملة. (٣٧,٧) ملجم / كجم يومياً للمجموعة التي تتعاطى أدوية فقط بدون علاج سلوكي .

وأسفرت نتائج هذه الدراسة الشاملة (MTA) عن الآتي :

- ١ - أظهرت النتائج بعد أربعة عشر شهراً من العلاج الطبيعي والعلاج السلوكي المكثف أو العلاج الطبيعي بمفرده أو السلوكي بمفرده انخفاضاً في مظاهر النشاط الزائد عند الأطفال .
- ٢ - أظهر العلاج الطبيعي بمفرده انخفاضاً في مظاهر النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD عن العلاج السلوكي المركز بمفرده .
- ٣ - أظهرت نتائج الدراسة أن العلاج المتداخل من الطبيعي والسلوكي معاً أفضل في علاج كثير من المشكلات الانفعالية مثل : الغضب ومشكلات الأداء الأكاديمي، ويحسن من العلاقات بين الطفل والديه، وينمي المهارات الاجتماعية وأفضل من العلاج الطبيعي بمفرده أو السلوكي بمفرده .
- ٤ - أظهرت نتائج برنامج النماذج المتعددة MTA نجاحاً أعلى من ٩٠ % في خفض مظاهر النشاط الزائد لدى أطفال المدارس الابتدائية .

وبعد انتهاء أكبر دراسة أجريت في هذا المجال (MTA) قامت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال [American Academy of Pediatrics (AAP) ٢٠٠١] بوضع دليل للممارسات العملية لخفض النشاط الزائد/ قصور الانتباه ADHD لدى الأطفال ويوضحه الشكل التخطيطي التالي .

(١) انظر دليل التشخيص لهولاء الأطفال  
(APP2000)



شكل رقم (٣) الدليل الكلينيكي للممارسات العملية لخفض النشاط الرازد / قصور الانبهار لدى الأطفال للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (APP, 2001)

## تعقيب:

تم فيما سبق عرض ابرز وقائع ونتائج التجارب والبحوث والبرامج التي تساعد في خفض المظاهر السلوكية للنشاط الزائد وقصور الانتباه، ويبدو ان جميع الجهد اهتمت بالبرامج متعددة النماذج أي تداخل أكثر من علاج في خفض المظاهر السلوكية للنشاط الزائد / قصور الانتباه . وأغلبها اشتمل على برامج تدخل تدريب الوالدين للتعامل مع الطفل ذي النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD، وبرامج التركيز على الطفل وبرامج التداخلات المدرسية وبرامج التداخل الطبي . واختلفت الطرق العلاجية طبقا لنوعية الأعراض والفرق الفردية للطفل حيث أن أعراض ضعف الانتباه – الاندفاعية والنشاط الحركي الزائد المفرط في الحركة من المحتمل أن تعالج بالبرامج الطبية، بينما تعالج الأعراض السلوكية اللاسوية بواسطة التعديل البيئي وبرامج وتعديل السلوك. أما نقص المهارات في المجالات الأكاديمية والاجتماعية فتعالج بالبرامج المعرفية وبرامج تدريب الوالدين والمدرسية حيث لا تستجيب للعلاج بالبرامج الطبية أو بعض البرامج السلوكية، ولكن يتوافر علاجها في المدارس وتدريب المعلم، وفي تعديل المناهج التعليمية وملاءمتها للطفل، وهذا ما ذهب إليه ونج (Wong 1999) حيث صنف أنواع العلاجات الخاصة للأطفال الذين يعانون من اضطراب النشاط الزائد/ قصور الانتباه ADHD، إلى أربعة أنواع هي :

- ١ - العلاج الطبي Stimulant Medication
- ٢ - تعديل السلوك Behavior Modification
- ٣ - تعديل السلوك المعرفي Cognitive Behavior Modification
- ٤ - تدريب الوالدين Parent Training

وأخيرا نستنتج من الدراسات السابق ذكرها في هذا المحور ان  
برامج النماذج المتعددة والتي يشترك فيها كل العلاجات معا من أنجح  
البرامج حيث ثبت نجاحها بنسب ٩٠٪ في علاج وخفض مظاهر النشاط  
الزائد النشاط الزائد / قصور الانتباه لدى أطفال المدارس الابتدائية .

## خلاصة ونعقابة :

### جدول رقم (٥)

يوضح عدد البرامج والدراسات الحديثة في خفض النشاط الزائد /  
قصور الانتباه لدى الأطفال في كل اتجاه .

لمجموع لبرامج و دراسات الأجنبية	لبرامج و دراسات العربية	لتجاه برامج و دراسات خفض لنشاط زائد / قصور الانتباه لدى الأطفال ( العليين - غير العليين ) .
٥	٥	١ - برامج و دراسات لنظام الغذائي
١٥	١٥	٢ - برامج وأنظمة طيبة
١٩	١٥	برامج و دراسات تنظيم وتعديل السلوك .
٤	٤	برامج و دراسات تعديل لسلوك المعرفي .
١٠	١٠	٥ - برامج و دراسات لتدريب الوالدين
٦	٦	٦ - برامج و دراسات متعددة النماذج .
٦٩	٦٥	المجموع الكلي

يتضح من الجدول السابق أن برامج خفض النشاط الزائد والدراسات الحديثة في ذلك تكثر بشكل ملحوظ في التراث البحثي الأجنبي، بينما هذه البرامج والدراسات محدودة في المجال البحثي العربي، والأمر الذي يلقي ببعاته على المهتمين بالأطفال بصفة عامة وباضطراب النشاط الزائد / قصور الانتباه بصفة خاصة لمضاعفة الجهد وتوجيه الدارسين إلى هذا المجال.

ولقد تطور مفهوم النشاط الزائد / قصور الانتباه في العصر الحاضر تطورة ملحوظاً في معظم الدراسات والبحوث، الأمر الذي دعا الباحثة على الاقتصار على بعض البرامج والدراسات الحديثة ذات العلاقة بهذا البحث

المرجعي . حيث تم انتقاء الحديث فقط من تلك البرامج الدراسات تمشياً مع موضوع البحث المرجعي .

ويظهر هذا جيداً في كم البرامج والدراسات الأجنبية التي استخدمت برامج خفض النشاط الزائد / قصور الانتباه لدى الأطفال والتي تناولت موضوع البحث المرجعي بشكل مباشر والذي يصل إلى تسعه وستين برنامجاً ودراسة حديثة، استخدمت برامج لخفض النشاط الزائد / قصور الانتباه . وقد تم تصنيف هذه البرامج والدراسات وفق الهدف الرئيس لكل منها في محاور بحثية وأطلق عليها المسميات الآتية على الترتيب:

المحور الغذائي، الطبيعي، تنظيم وتعديل السلوك، تعديل السلوك المعرفي، تدريب الوالدين، برامج متعددة النماذج . وقد أسلهم هذا التصنيف في الكشف عن أبرز الاتجاهات الحديثة في برامج خفض النشاط الزائد / قصور الانتباه لدى الأطفال .

وسوف يتم مناقشة هذه الاتجاهات في مجموعتين :

الأولى تمثل اتجاهات خاصة بكل محور على حدة ، والثانية تمثل اتجاهات عامة تعكس ملامح مشتركة بين المحاور البحثية المختلفة، أو أغلبها على الأقل . وفيما يلي عرض ومناقشة تلك الاتجاهات في ضوء هذه التصنيفات.

أولاً - اتجاهات خاصة بكل محور بحثي فيما يلي :

١ - ظهور الاتجاه الغذائي، حيث يتضمن المحور الخاص بذلك على خمسة برامج ودراسات استخدمت برامج غذائية محددة، وتوصلت إلى النتائج الآتية :

- تم التأكيد من فعالية البرنامج الغذائي المحدد في خفض النشاط الزائد / قصور الانتباه والذي يحتوى على بعض الأطعمة الممنوعة والتي تؤثر في ظهور المظاهر السلوكية للنشاط الزائد / قصور الانتباه وهي السكر -

- اللبن - الذرة - الشكولاتة - البيض - الدقيق - الألوان الصناعية - محسنات الطعم .
- وأوصت بعض الدراسات بإضافة بعض المعادن مثل (عنصر الفوسفاتديل سيرن) وذلك لتقوية الذاكرة (النسيان) .
- ثبت فعالية برنامج غذائي خاص لحفظ نسبة السكر في الدم للأطفال الذين يعانون من النشاط الزائد / قصور الانتباه .
- ٢- ظهور الاتجاه الطبيعي حيث يتضمن المحور الخاص به على خمسة عشر برنامجاً وأنظمها طبينة توصلت إلى النتائج الآتية :
- ثم التعرف على العقاقير والأدوية المنشطة التي تؤثر في خفض النشاط الزائد مثل مركبات المثيل فينيدات منها عقار "الريتالين" ومركبات الأمفيتامينات ومنها عقار "الدكسدرلين"، "والأديرال" وبعض الأدوية المضادة للأكتئاب .
- ثبت فعالية استخدام التغذية الراجعة الحيوية بجهاز الأشعة المقطعيّة للمخ EEG في خفض النشاط الزائد / قصور الانتباه لدى الأطفال .
- توصل الباحثون إلى التعرف على أحسن جرعة دوائية آمنة وهي الجرعة التي تظهر انخفاضاً ملحوظاً في المظاهر السلوكية للنشاط الزائد / قصور الانتباه مع أقل نسبة من التأثيرات الجانبية .
- فعالية الأدوية المنشطة أو المنبهة في خفض مظاهر النشاط الزائد / قصور الانتباه والتحكم في الاندفاعية، وخفض السلوك النشط الخاص بالمهام مثل السلوك الخاص بالجلوس داخل المنزل أو المطعم أو المدرسة، وتساعد هذه الأدوية في زيادة الانتباه، وأخيراً تساعد في خفض الضوضاء والسلوك المزعج لدى الأطفال .
- ٣- ظهور اتجاه برامج تنظيم وتعديل السلوك . حيث يتضمن المحور الخاص بذلك على تسعه عشر برنامجاً ودراسة، توصلت إلى النتائج الآتية:

- ثبت فعالية برنامج التدريب على تنظيم السلوك للطفل وللوالدين معا في خفض المظاهر السلوكية للنشاط الزائد / قصور الانتباه والسلوك الفوضوي لدى الأطفال .
- فعالية برنامج لتعديل السلوك باستخدام اسلوب التدريب الذاتي وأساليب العلاج المتمرکز على الطفل وأساليب النمذجة لرفع مستوى الأداء وخفض مظاهر النشاط الزائد / قصور الانتباه .
- فعالية برنامج النمذجة الذاتية باستخدام شرائط الفيديو في رفع مستوى الأداء في مادة الرياضيات وخفض المظاهر السلوكية اللاتكيفية للنشاط الزائد / قصور الانتباه .
- فعالية برنامج لتعديل السلوك داخل غرفة الصف للتعرف على السلوكيات غير المرغوب فيها لرفع مستوى الأداء الأكاديمي وزيادة احترام الذات وخفض مظاهر النشاط الزائد / قصور الانتباه لدى الأطفال .
- فعالية برنامج حركي باستخدام الألعاب البدنية لتنظيم السلوك الانفعالي وخفض مظاهر النشاط الزائد / قصور الانتباه وخفض مشاعر الغضب لدى الأطفال .
- فعالية برنامج لتعديل السلوك باستخدام أسلوب التعزيز الإيجابي، تكلفة الاستجابة، وبرامج التعلم، في رفع مستوى الأداء الأكاديمي وخفض السلوكيات المميزة للنشاط الزائد. / قصور الانتباه مثل عدم الطاعة، تكمّله المهام – عدم التعاون – السلوك الاجتماعي اللاتكيفي .
- فعالية برنامج سلوكي يستخدم أسلوب التعاقد التبادلي – وأسلوب التدريس الملطف في خفض النشاط الزائد وقصور الانتباه لدى أطفال ما قبل المدرسة .
- فعالية برنامج الخطوة الأولى للطفل وللوالدين في كيفية استخدام أنواع التعزيز المختلفة، وتنمية مهارات الوالدين الاجتماعية وكيفية التحكم في

الانفعالات، ومفاهيم البيئة الاجتماعية في حياة طفل ما قبل المدرسة الذي يعاني من النشاط الزائد / قصور الانتباه .

– فعالية برنامج للتدريب على أسلوب حل المشكلات وبرنامج آخر تستخدم أسلوب الاسترخاء العضلي وذلك في ضبط التوتر النفسي كمظهر من مظاهر النشاط الزائد / قصور الانتباه لدى الأطفال .

– فعالية برنامج للتدريب على أسلوب حل المشكلات وبرنامج آخر تستخدم أسلوب الاسترخاء العضلي وذلك في ضبط التوتر النفسي كمظهر من مظاهر النشاط الزائد / قصور الانتباه لدى الأطفال .

– فعالية برنامج لتنظيم السلوكيات المعارضه عن طريق البطاقات التبعية لتنظيم السلوك وتنمية تدريب الوالدين في خفض مظاهر النشاط الزائد / قصور الانتباه لدى الأطفال .

– فعالية برنامج لتعديل السلوك باستخدام أساليب العلاج السلوكي مثل : أسلوب التعزيز الإيجابي – التعلم بالنموذج في خفض مظاهر النشاط الزائد / قصور الانتباه لدى الأطفال.

– فعالية برنامج الضبط الذاتي لخفض السلوك الاندفاعي لدى الأطفال الذين يعانون من النشاط الزائد والمتخلفين عقلياً وتدريبهم على تعديل أنماط التحدث للذات الذي يؤدي بدوره إلى تعديل السلوك .

– فعالية برنامج للتعلم الفردي ، عن طريق دليل إرشادي للتدخلات التربوية بواسطة المعلم لتحسين الأداء الأكاديمي والاجتماعي للأطفال ذوي الحاجات الخاصة ويعانون من النشاط الزائد/ قصور الانتباه .

– فعالية برنامج للتدخل المهني باستخدام نموذج التركيز على المهام في خفض مظاهر النشاط الزائد / قصور الانتباه لدى الأطفال المتخلفين عقلياً (فئة الإعاقة العقلية المتوسطة) – وأخيراً تم استخلاص دليل للعلاج السلوكي الأكثر فاعلية لخفض النشاط الزائد/ قصور الانتباه لدى الأطفال.

٤ - ظهور اتجاه لبرامج تعديل السلوك المعرفي، حيث يتضمن هذا المحور على أربعة برامج ودراسات، توصلت إلى النتائج الآتية :

- فعالية برامج تعديل السلوك المعرفي في تنمية مهارات الانتباه، والقدرة على التركيز - والتعلم باللحظة عن طريق برامج التدريب اللغوي / غير اللغوي . وخفض النشاط الزائد / قصور الانتباه لدى الأطفال .
- فاعلية برامج التربية الذهنية في كيفية التطبع بفاعلية واستقلالية مع المشكلات العقلية والمعرفية وموافق الحياة الاجتماعية الخاصة بالانتباه مع خفض النشاط الزائد / قصور الانتباه لدى الأطفال .

٥ - ظهور اتجاه لبرامج تدريب الوالدين ، حيث يتضمن هذا المحور عشر برامج ودراسات توصلت إلى النتائج الآتية :

- نجحت برامج تدريب الوالدين في إكساب الوالدين المهارات المطلوبة للتحكم في سلوك الطفل ذو النشاط الزائد / قصور الانتباه
- نجحت في إكساب الوالدين درجة عالية من الفهم لاضطراب النشاط الزائد / قصور الانتباه وتعريفهم باحتياجات طفلهما للعلاج .
- نجحت في إكساب الوالدين مهارة كيفية استخدام أساليب التعزيز المختلفة في تعديل المظاهر السلوكية للنشاط الزائد / قصور الانتباه وتعديل الاندفاعية الفطرية في سلوك الطفل
- ساعدت الوالدين في خفض ضغوطهم وبالتالي أثر على خفض المظاهر السلوكية للنشاط الزائد / قصور الانتباه لدى أطفالهم .
- ساعدت في تحسين المظاهر السلوكية للنشاط الزائد / قصور الانتباه مع زيادة سلوكيات الطاعة . ADHD
- نجحت في تدريب الوالدين على عمليات الاتصال، إعادة تشكيل السلوك وتنظيم السلوك الفوضوي، تعليمهم أسلوب حل المشكلات .

– تم التعرف عن طريق هذه البرامج على مناطق القوة والضعف في الطفل الذي يعاني من النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD حتى يسهل التنبؤ بالخطط المستقبلية لعلاجه .

– نجحت هذه البرامج في إعطاء الوالدين تعليمات أو إرشادات للاهتمام بأنفسهم والمحافظة على صحتهم من الضغوط الناشئة عن سوء الخبرة في التعامل مع مشكلات النشاط الزائد / قصور الانتباه لدى الطفل .

– تساهم في إعداد المعلم الجيد الذي يتعامل مع الأطفال الذين يعانون من النشاط الزائد / قصور الانتباه ADHD .

– ساعدت على خفض المظاهر السلوكية للنشاط الزائد / قصور الانتباه وزيادة احترام الذات، تحسين النظرة العامة للحياة لدى الأطفال الذين يعانون من هذا الاضطراب.


– أخيراً نجحت برامج تدريب الوالدين مع برنامج الضبط الذاتي في خفض المظاهر السلوكية للنشاط الزائد / قصور الانتباه لدى الأطفال المختلفين عقلياً .

– ظهرت اتجاه برامج متعددة النماذج باهتمام ملحوظ في الآونة الأخيرة حيث تضمن المحور على ستة عشر برنامجاً ودراسة، توصلت إلى النتائج الآتية .

– نجحت البرامج متعددة النماذج باستخدام التدخلات السلوكية من أساليب التعزيز الخاصة وكيفية استخدامها – والتدعيم الاجتماعي – وأسلوب النمذجة – وأسلوب حل المشكلات والتدريب على المهارات الاجتماعية في تغيير سلوك الوالدين تغييراً إيجابياً مع زيادة في احترام الذات وخفض المظاهر السلوكية للنشاط الزائد/ قصور الانتباه. وتحسين السلوك الاجتماعي والمهارات الرياضية

- نجاح أسلوب العمل التعاوني الذي يشتمل على الأساليب الدوائية وبعض أنواع أساليب العلاج السلوكي بالتحدث للذات أثناء أداء المهمة في تنمية مهارات التحكم في الاستجابات، ومهارات التحدث للذات أثناء أداء مهمة عقلية .
- فعالية اشتراك التدخلات الطبية والبرامج السلوكية معا حيث أعطت نتائج أكثر فائدة في خفض المظاهر السلوكية للنشاط الزائد / قصور الانتباه عن التدخلات الطبية وحدتها أو التدخلات السلوكية بمفردها وخاصة في البرنامج الصفي المكثف اليومي ( STP ) .
- فعالية برامج التدخلات التربوية في برامج النماذج المتعددة في خفض النشاط الزائد / قصور الانتباه لدى الأطفال، وتنمية التحكم الذاتي - تنمية مهارات حل المشكلة - تحسن في الأداء الأكاديمي - تدعيم عمليات التعلم.
- اختفت الأساليب العلاجية في البرامج متعددة النماذج طبقا لنوعية المظاهر السلوكية للنشاط الزائد / قصور الانتباه لدى الأطفال حيث أن أنظمة العلاج الطبيعي تفيد في علاج مظاهر ضعف الانتباه - الاندفاعية - النشاط الحركي المفرط . بينما تفيد برامج تعديل السلوك البيئي في تحسين المظهر السلوكية اللاتكيفية، وتفيد برامج تعديل السلوك المعرفي في تنمية المهارات الأكademie والاجتماعية وذلك بتعديل المناهج التعليمية الملائمة واشترك برامج التدريب على المهارات الاجتماعية للأطفال مع برامج تدريب الوالدين مع الأنظمة الطبية والأدوية المنشطة أو المنبهة جميعا تفيد في خفض النشاط الزائد / قصور الانتباه لدى الطفل
- وأخيرا أظهرت نتائج برامج النماذج المتعددة MTA نجاحا أعلى من ٩٠ % في خفض مظاهر النشاط الزائد لدى الأطفال في المدارس

الابتدائية ويوضح الشكل التالي التمثيل البياني لأعداد البرامج والدراسات الحديثة في خفض النشاط الزائد / قصور الانتباه لدى الأطفال .



شكل (٣)

تمثيل بياني لأعداد البرامج والدراسات لخفض النشاط الزائد / قصور الانتباه لدى الأطفال في كل اتجاه

يتضح من الشكل السابق تفاوت عدد البرامج والدراسات الحديثة في كل اتجاه من الاتجاهات البحثية التي تناولت برامج خفض النشاط الزائد / قصور الانتباه لدى الأطفال . الأمر الذي يعيد ترتيب هذه الاتجاهات حسب درجة شيوع البرامج والدراسات الحديثة في كل اتجاه على النحو التالي :

- ١ - برامج تنظيم وتعديل السلوك .
- ٢ - برامج النماذج المتعددة .
- ٣ - البرامج الطبية .

٤ - برامج تدريب الوالدين .

٥ - البرامج الغذائية .

٦ - برامج تعديل السلوك المعرفي .

وإذا كان ترتيب هذه الاتجاهات على هذه الصورة يعطي مؤشرا في

اتجاهين :

الاتجاه الأول : أن شيوخ البرامج في هذا البحث المرجعي في الاتجاه الأول والثاني (برامج تنظيم وتعديل السلوك والبرامج متعددة النماذج قد يعطى أهمية كبيرة لهذه البرامج والدراسات الحديثة في خفض النشاط الزائد / قصور الانتباه لدى الأطفال . ويفتح الباب أمام الدراسات العربية للمزيد من عمل برامج في مثل هذا الاتجاه .

الاتجاه الثاني : ندره الدراسات في الاتجاه الأخير (تعديل السلوك المعرفي مما يؤكده بكريه هذا الاتجاه والحاجة إلى مزيد من البرامج والدراسات العربية في هذا الاتجاه .

وأخيرا نلاحظ أن غالبية البرامج والدراسات الحديثة كلها برامج ودراسات، أجنبية أما البرامج والدراسات العربية فتمثل أربع دراسات وأغلبها في برامج خفض النشاط الزائد / قصور الانتباه لدى الأطفال المختلفين عقليا، الأمر الذي يعكس قلة العمل البحثي العربي في برامج خفض النشاط الزائد / قصور الانتباه لدى الأطفال .

## المراجع

### المراجع العربية

- ١ - أحمد محمد مطر (١٩٩٢) : "دراسة للتعرف على ما يعانيه الأطفال من مشكلات نفسية في مرحلة الحضانة والروضة"، بحوث المؤتمر السنوي الخامس للطفل المصري، المجلد الثاني ص ص ١٠٨١ - ١٠٩١ .
- ٢ - حامد عبد السلام زهران (٢٩٨٠) : علم نفس النمو، الطفولة والمرأفة، (ط ٦) القاهرة : عالم الكتب ص ١٧٠ .
- ٣ - حامد عبد السلام زهران (١٩٩٨) : التوجيه والإرشاد النفسي، (ط ٣)، القاهرة : عالم الكتب ص ١٧٠ .
- ٤ - سعيد بن عبد الله إبراهيم والسيد إبراهيم السمادوني (١٩٩٨) : "فعالية التدريب على الضبط الذاتي في علاج اضطراب عجز الانتباه المصحوب بالنشاط الحركي الزائد لدى الأطفال المتخلفين عقلياً وقابلية للتعلم"، علم النفس، العدد السادس والأربعون، السنة الثانية عشرة، الهيئة المصرية للكتاب، ص ٨٨ - ١٢١ .
- ٥ - سعيد عبد العزيز محمود عويضة (٢٠٠١) : "فاعلية نموذج التركيز على المهام في علاج مشكلة النشاط الزائد للأطفال ذوي الحاجات الخاصة (فئة الإعاقة العقلية المتوسطة)", التربية، جامعة الأزهر - العدد ٩٧، ص - ص ١٦٨ - ٢٠٠٢ .
- ٦ - عبد الرحيم بخيت (١٩٩٩) : "دليل التشخيص الأخصائي الرابع للاضطرابات العقلية"، المجلة المصرية للدراسات النفسية، مجلد ٩، عدد ٢٤، ص ص ٥٠ - ٦٦ .

- ٧ - عبد العزيز الشخصي (١٩٨٥) : "دراسة لحجم مشكلة النشاط الزائد بين الأطفال وبعض المتغيرات المرتبطة به" ، مجلة كلية التربية، جامعة عين شمس، العدد التاسع، ص ٢٠.
- ٨ - عبد الفتاح القرش (١٩٩٣) : "الضغوط التي ت تعرض لها الأطفال الكويتيون خلال العدوان العراقي وعلاقتها ب مدى توافقهم النفسي والاجتماعي" ، عالم الفكر، المجلد ٢٢ والعدد (١)، ص ص ٨٠ - ١٢٣ .
- ٩ - عثمان لبيب فراج (١٩٩٩) : "النشاط الحركي الزائد وقصور القدرة على التركيز والانتباه" ، مجلة خطوة، العدد الثامن ص ص ٢٨ - ٣٢ .
- ١٠ - علا عبد الباقى إبراهيم (١٩٩٥) : "دراسة مدى فاعلية بعض فتيات تعديل السلوك في خفض مستوى النشاط الزائد لدى الأطفال ذوي الإعاقة العقلية" ، رسالة دكتوراه، كلية التربية - جامعة عين شمس .
- ١١ - علا عبد الباقى إبراهيم (١٩٩٩) : علاج النشاط الزائد لدى الأطفال باستخدام برامج تعديل السلوك، سلسلة التوجيه والإرشاد في مجالات إعاقات الطفولة، القاهرة: الجريس للكمبيوتر والطباعة والتصوير ص ٢٨ .
- ١٢ - عفاف حداد، باسم دحادة (١٩٩٨) : "فعالية برنامج إرشادي جمعي في التدريب على حل المشكلات والاسترخاء العضلي في ضبط التوتر النفسي" مجلة مركز البحث التربوي، جامعة قطر، العدد الثالث عشر، السنة السابعة، ص ص ٥١ - ٧٦ .
- ١٣ - عفاف حمد عبد المنعم (١٩٩١) : "المشكلات السلوکية وبعض نواحي الشخصية لدى الأطفال المتخلفين عقلياً بمدارس التأهيل

الفكري ، بحوث المؤتمر السنوي الرابع للطفل المصري،

المجلد الثالث، ص ص ١٧٤٣ - ١٧٥٩

١٤ - عفاف محمد محمود عجلان (٢٠٠٢) : صعوبات التعلم الأكاديمية وعلاقتها بكل من اضطرابات القصور في الانتباه - النشاط المفرط واضطراب السلوك لدى تلميذ المرحلة الابتدائية "مجلة كلية التربية" - جامعة أسيوط، المجلد الثامن عشر، العدد الأول ص ص ٦٢ - ١٠٨ .

١٥ - فؤاد حامد الموافي (١٩٩٥) : "دراسة تجريبية لخفض النشاط الزائد لدى أطفال ما قبل المدرسة" ، مجلة كلية التربية، جامعة المنصورة، الجزء الأول، عدد ٢٨، ص ص ١ - ٣٧ .

١٦ - لويس كامل مليكة (١٩٩٧) : العلاج النفسي، مقدمة وخاتمة، القاهرة: مطبعة فيكتور كرلس ، ص ١٠٤ .

١٧ - محمد عوض سلم، لأحمد لأحمد عود (١٩٩٤) : "مفهوم ذات ومركز الحكم لدى التلاميذ ذو صعوبات تعلم" ، مجلة الإرشاد النفسي، جمعية عين شمس، المجلد الثاني، ص ص ٢٣٩ - ٢٩٤ .

#### المراجع الأجنبية :

- 18- Abbott, A.A.(1993): Relationship between mental satisfaction and attention deficit disorders with and without hyperactivity, Dissertation Abstract International, Vol.53, No.(11), PP.3844-3845.
- 19-Almeida,Rosenberg Mercedes E., (1998): “PyGmalion: Parnet training for families of children diagnosed with attention deficit hyperactivity disorder,” Dissertation Abstracts International, Vol.59, No.(09), B.P.5068.

- 20- Alonso, Mahoney Maria (1997): "First step program: Infant intervention for parents of children at risk for attention deficit / hyperactivity disorder, ", Dissertation Abstracts International, Vol.59, No.(02) B.P.862.
- 21- American Academy of Pediatrics & Committee on children with disabilities," (1993) : "Pediatric services for infants and children with special car needs," Pediatrics, Vol.92, PP.163-165.
- 22-American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, (1997):" Practice parameters for the assessment and treatment of children, adolescent, and adults with attention deficit hyperactivity disorder," Journal of American Academy Children Adolescent Psychiatry, Vol. 36, No.(10), PP.56-69.
- 23- American Academy of Pediatrics, (2000):" Practice guideline: diagnosis and evaluation of a child with attention deficit/ hyperactivity disorder, Pediatrics, Vol.105, PP.1158-1170.
- 24- American Academy of Pediatrics (AAP), (2001): "Clinical Practice Guideline: Treatment of the school- aged child with attention deficit/ hyperactivity disorder, Pediatrics, Vol.108, No.(4), PP.1033-1044.
- 25- American Psychiatric Association, (1994): Diagnostic and statistical manual of mental disorder (4 th. ed), Washington, DC.: American Psychiatric Association PP.54-67.
- 26- Anastopoulos, Arthur D.& Shelton, Terri, L.,& DuPaul, George, L.,Guevremont, David, C. (1993): " Parent training for attention deficit hyperactivity disorder, its impact on parent functioning " Journal of Abnormal child Psychology, Vol.21, No.(5),PP.581-596.
- 27- Antar, Georgi York, (1994): " A school based multimodal intervention program for children with attention deficit

- hyperactivity disorder". Dissertation Abstracts International. Vol.55, No.(08), P.2277.
- 28-Armstrong, L.,(1993): And they call it help: the psychiatric policing of American's children, New York: Addison, Wesley Publishing co. PP. 37-48.
- 29-Barkley, R. A., Fischer, M., Edelbrock, es., smallish L.(1990): " The adolescent outcome of hyperactive children diagnosed by research criteria : 1: an 8- Years prospective follow up study, Journal of American Academy children Adolescent psychiatry, Vol. 29.PP.,546-557.
- 30-Barkley, R.A., Grodzinsk, G.,& Dupaul, G.L., (1992): "Frontal lobe- functions in attention deficit disorder with and without Hyperactivity: A review and research report", Journal of abnormal child Psychology,Vol.20, No.(2), PP163-184.
- 31-Barkley, R.A.(1996): Attention deficit hyperactivity disorder, In E. Mash & R .Barkley (Eds), child psychopathology, New York: Guilford, PP.63-112.
- 32- Barkley, R.A., (1998): Hand' book on attention deficit hyperactivity disorder, 2 ed., New York : Guilford press. PP.20-26.
- 33- Bee, Helen, (1995): Growing child, New York: Harper Collins collge Publishers, P.417.
- 34- Beyer, Michelle McMaster, (1994) " Group parent training for attention deficit hyperactivity disorder" Dissertation Abstracts International Vol.55, No.(09),P.4108.
- 35- Blackman, Y.A.,(1999) : "Attention deficit/hyperactivity disorder in preschool, does it exist and should we treat it ? " pediatric clinic North America, Vol.46, No.(5), PP.1011-1025.
- 36-Blakemore, B., shindler, A.,& conte, R.,(1993): " A problem solving traning program for parents of

- children with attention deficit hyperactivity disorder," Canadian Journal of school psychology, Vol.9,No.(1), PP.66-85.
- 37-Bornstein, P.,& Guevillan, R., (1991) : " The effects of a self- instructional package on overactive school boys, Journal of Applied Behavior Analysis, Vol.19, P.18.
- 38- Breggin, P.,(1991): Toxic Psychiatry: Why therapy empathy and love must replace the drugs, electroshock and biochemical theories of the New Psychiatry, New York: st Martins Press- pp.20-25.
- 39- Breggin, Peter & Breggin, Ginger Ross, (1995): " The Hazards of treating" Attention deficit hyperactivity disorder, with Methyl Phenidate ( Ritalin)", Journal of college student Psychotherapy, Vol.10,No.(2).PP.55-72.
- 40- Breggin, Peter R.,(1999) :"Psychostimulants in the treatment of children diagnosed with ADHD: Risks and mechanism of action", International Journal of Risk and safety in Medicine, Vol.12, PP.3-35.
- 41- Brito, G.N. Pinto, R.C.,& Lins, MF., (1995): " A behavioral assessment scale for attention deficit disorder in Brozilian children based an DSM 111 R criteria," Journal of Abnormal Child Psychology Vol.23, No.(4) , PP.509-520.
- 42-Carlson, CarynL.,&Pelham, williame., Milich, Richard, & Dixon, Joanne, (1992): "Single and combined effects of methylphenidate and behavior therapy on the classroom performance of children with attention deficit hyperactivity disorder," Journal of abnormal child Psychology, Vol.20,No.(2), PP.213-232.
- 43- Carlson, E.A.. Jacobitz, D., & stroufe L.A., (1995):"A developmental investigation of

- inattentiveness and hyperactivity" Child Development, Vol.66, PP.37-54.
- 44-Cenacchi,T.,et.al.(1993): "Cognitive decline in the elderly: A double blind, Plasbo controlled multicenter study on efficacy of phosphatidyl serine administration," Aging, Vol.5,PP.123-133.
- 45-Chernomazova, Yelena, (1996): " Hyperactive child", Available online, <http://www.owl.ru/eng/womplus1996/hypera.htm> P.1-3
- 46-Coffey, L.D.(1993) : "Effects of methylphenidate on self regulatory speech of children with attention deficit hyperactivity disorder," Dissertation Abstracts International, Vol.54, No.(6), P.2093A
- 47-Cown, Doug (2002): " Attention deficit hyperactivity disorder Here's our eating program. We hope that it help. " available online, <http://www.newideas.net.adddiet.htm>. Pp.1-3.
- 48-Danforth, Jeffey S., (1998): Behavior management for hyperactive children with oppositional behavior at home and school. U.S.A: Eastern Connecticut state university. PP. 1-9.
- 49-Deutsch, c.K.& Kinsbourne, M.(1990): " Genetics and biochemistry in attention deficit disorder," in M. Lewis & S.M. Miller (Eds.) Handbooks of developmental psychopathology New York: Plenum, PP.93-108.
- 50-Druckman, M., Minevich, A.(2001) : "Application of EEG Nero feedback for attention deficit disorder". available online, <http://webid.eas.com/biofeedback/research/tdruckman.Shtm1>, PP.1-9.
- 51-Dupaul, G.J., Government, D.C.& Barkley, R.A., (1992): Behavioral treatment of attention deficit hyperactivity disorder in the classroom the use of the attention training system, Journal of Behavior modification, Vol.16, PP.204-225.

- 52-Eghbalieh, B., Crinella, F.M., Hunt, L.E., Swanson, J.M., (2000): " Parental stimulant effects of alerting and executive control in six and seven years olds," Journal of Attention Disorders' Vol.4, No.(1), PP.102-110.
- 53- Erhardt, Drew & Baker, Brue, (1990): " The effects of behavioral Parent traning on families with young hyperactive children": Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, Vol., 21, No.(2)pp.121-132.
- 54- Fark, Alan to siwek, Jay Editor,(1997) " Attention deficit hyperactivity disorder to treat or not " American Family Physician, Vol.56., No.(3), PP.635-650.
- 55- Fee, V.E.& Matson, J.L.,& Benavidez, D.A., (1994) : "Attention hyperactivity disorder among mentally retarded children", Research in disabilities, Vol.15,No.(1), P,67.
- 56-Fowler, M., (1991): "Attention deficit disorder" Mental Information Center for Children and Youth with Disabilities, Vol.4, PP.15-26.
- 57- Fowler, Mary (2002): Attention deficit/ hyperactivity disorder, what l do if my child is found ineligible for service? , Part 5, Available online, <http://www.Kidsowce.Com/NICHCY/ADD5.htm> 1.,P.1-5.
- 58-Frankel, Fred, & Myatt, Robert, Cantwell, Dennis, P., & Fenberg, David,T.,(1997): "Parent- assisted transfer of children's social skills training : Effects on children with and without attention deficit hyperactivity disorder", Journal of the American Academy of Child and Adolescent psychiatry, Vol.36,No.(80,PP.1056-1064.
- 59-Gadow, Kenneth D.,& Pomeroy, John C.(1990): " A controlled case study of Methylphenidate and Fenfluramine in a young mentally retarded, Hyperactive child. " Australia and New Zealnd, Journal of Developmental Disabilities, Vol.16, No.(4)PP.323-334.
- 60-Gadow, K.D., (1992): " Pediatric psychopharmacotherapy: A review of recent

- research” Journal of Child Psychological Psychiatry, Vol.33, No.(1), PP.153-195.
- 61- General Nutrition Center Givini Clinics (GNC),(2002):” ADHD Diet” New York: Gavini Clinics , Available online, <http://www.adhd clinic. Com generic. htm> 1? PP.1-3.
- 62- Ghosh,Shampa, & Chattopadhyay, Prabal K., (1993): “Application of behavior modification techniques in treatment of attention deficit hyperactivity disorder: A case report, Indian Journal of Clinical psychology Vol.20, No.(2).PP.124-129.
- 63- Gilger, J.W.Pennington, B.F.& Defries,J.(1992): “A twin study of the etiology of comorbidity : Attention- deficit hyperactivity disorder and dyslexia.,” Journal of the American Academy of child and Adolescent Psychiatry, Vol.31, PP.343-348.
- 64-Gillberg, C.,& Melander, H., Von Knorring, A.L., Janols, L.O., The Thernlund, G., Hagglof, B., Eidevall, wallin,L., Gustafsson, P., and Kopp, S.; (2001): “ Long- term stimulant treatment of children with attention deficit hyperactivity disorder symptoms, a randomized, double- blind, placebo-control trial”, Arch Gen Psychiatry, Vol.58, No.(12) PP. 1184-1187.
- 65- Gittelman, B.R., (1991): Hyperactive child and their socialization” British Journal of Criminology, Vol.25, No.(3), PP.261-276.
- 66- Golden, G.S.(1991): “ Role of attention deficit hyperactivity disorder,” Learning Disables, Seminars in Neurology, Vol. 11,No.(1),P.3541.
- 67- Goldhaber, Sondra,B.(1991):” Summer day treatment for children with attention deficit hyperactivity disorder,” Hospital and

Community Psychiatry, Vol.42, No.(4),PP.422-424.

- 68- Goldstein, S.& Ingersoll, B.D.,(1993): Attention deficit disorder and Learning disabilities: Realities Myths and controversial treatments, New York: Doubleday, PP.20-25.
- 69- Goldstein, S,& Goldstein, M., (1998) Managing attention deficit hyperactivity disorder ; A guide for practitioners, 2<sup>nd</sup> Edition, New York: Wiley Inter science Press, PP20-25.
- 70- Goldstein, Sam, (1999): " ADHD as a disorder of self regulation, " paper presented at 11<sup>th</sup> Annual conference for CH.H.D.D. October 7-9, available online, <http://www.Samgoldstein.Com/articles/9910-chadd.htm1>
- 71-Gordon, M., Mettlmen, B.B.,& Irwin,J. (1991): ADHD/ Hyperactivity consumers, guide for parents and teachers, New York: Gordon system, Inc.
- 72- Greenhill, L.L., et. Al.,(1996): "Medication treatment strategies in the M.T.A.: Relevance to clinicians and researchers": Journal of American Academy of Children, Adolescent Psychiatry, Vol.35, P.1304-1313.
- 73- Halperin, J.M.,(1993):"Self- regulatory functions in ADHD children," Dissertation Abstract International Vol.53,No,(10) B,P5462.
- 74- Hall, cathy w., Kataria sudeesh, (1992):" Effects of two treatment techniques on delay and vigilance tasks with attention deficit hyperactive disorder (ADHD) children, " Journal of Psychology, Vol. 126, No.(1), PP.17-25.
- 75- Hamiliton fish Instute, (2001): Cognitive training program for hyperactive children available online, <http://www.ham-fish.org/programs/id/138>/PP.1-5.

- 76-Heilveil, I.,& Clark, D., (1990): " Personality correlates of attention deficit hyperactivity disorder, " paper presented at the Annuals Conference of the American psychology Association, Boston:7-9<sup>th</sup> November.
- 77-Horn, F.H.,& Ialongo, N.,& Greenberg G., & Bakard, T., and Winberry c.s. (1990) : " Additive effects on behavioral Parent learning and self- control therapy with attention deficit hyperactivity disordered children," Journal of Clinical Child Psychology, Vol. 19, No.(2), PP.389-410.
- 78-Hoving, Callaway Karen (1996): "An efficacy study exploring a multimodal & treatment program for children and adolescents with attention deficit/ hyperactivity disorder: AQUASI- experimental design," Dissertation Abstracts International, Vol.57. No.(09),B.P.5921.
- 79- Hunt, R.D., Arnstem, A.F., Asbell, M.D, (1995): " An open trial of Quanfacin in the treatment of attention deficit hyperactivity disorder, " Journal of American Academic Children Adolescent psychiatry, Vol. 34, No.(1), PP.50-64.
- 80- Ingram, S. Hechtman, L., Morgwnstern, G., (1999): " Out comes issues in ADHD: adolescent and adult long- term outcomes," Journal of Mental Retarded Development Disability Resource Review, Vol. 5, PP243-250.
- 81- Jeensen, Peters s.& Pfeffer, Cynthia, (1997): " Evaluation and revolution in child psychiatry: ADHD as a disorder of adaptation," Journal of the American Academy for Child and Adolescent Psychiatry, Vol.36. No.(12), PP.1572-1679.
- 82- Jensen, P.,& Armold, L& Richters, J. et.al., (1999): 14 month randomized clinical trial of treatment strategies for attention deficit hyperactivity

- disorder." Arch Gen Psychiatry, Vol.56, PP. 1073-1086.
- 83-Kaiser, Michael, (1992) :" Effect of behavior modification in the classroom on academic functioning and self- esteem in hyperactive children, " Dissertation Abstracts International, Vol., 53, No.(12), B. P. 6534.
- 84- Kendall, P.c.(1990): Coping cat work book, Department of psychology, Philadelphia: Temple University, P.A.
- 85- Kaneko, M. and others (1993): " Hypothalamic- pituitary-adrenal axis function in children with attention deficit hyperactivity disorder," The Journal of Autism and Developmental Disorder, Vol.23, No.(1),PP.59-65.
- 86-Kewley, Geoffrey. D., (1998): "Attention deficit hyperactivity disorder is under diagnosed and under treated in Britain, " British Medical Journal, Vol.316 PP.1594-1596.
- 87- Koppekin, A.L., (1994): An experimental analysis of by adults with mental retardation , unpublished master degree, University of North taxes.
- 88- Kuntsi, J., Stevenson, J.(2001): "Psychological mechanisms in hyperactivity: the role of genetic factors", Journal of Child Psychological Psychiatry Vol.42, No.(2), PP.211-219.
- 89- Landover, D., (2001): " Children's mental health , attention deficit/ hyperactivity disorder," National Mental Health Association, online, <http://www.nmha.org/infofactsheets/17.cfm>.pp.1-9.
- 90- Lauth, Gerhard W., Linderkamp, Friedrich (1998): " Formative evaluation of an intervention program for attention deficit/ hyperactivity disorder," Psychology in Erziehung and Unterricht, Vol. 45, No(2), PP.81-91.
- 91- Leehey, Kevin (1994): "Attention deficit hyperactivity disorder,"Child Adolescent and Adult psychiatry,

- online, <http://www.Leeheyn.Com/adhd info.htm>  
PP. 1-10.
- 92- Leung, A.K., Robson, W.L., Fagan, J. E., & lim, S.H.,(1994) : "Attention deficit hyperactivity disorder: Getting control of impulsive behavior", Postgrad Medicine, Vol.195, PP.153-160.
- 93- Lombard, Jay & Germano, Carl, (1998): " The Brain wellness plan- Breakthrough medical, Nutritional and Immune boosting therapies to prevent and treat depression, Alzheimer's disease, chronic fatigue syndromes, attention deficit disorder multiple sclerosis, Parkinson's disease, Lou Gehrig's disease," New York; Kensington publishing Co., PP191-198.
- 94- Loon, M.Roth, (2000): " Effects of caffeine on cognitive psychomotor, and affective performance of children with attention deficit/hyperactivity disorder," Journal of Attention Disorder, Vol.4, No.(1),PP.134-144.
- 95-McCone David Ross (1993): " Stimulant medication and behavioral treatment for ADHD : Assessment of separate and combined effects using single subject methodology (Attention deficit hyperactivity disorder), Dissertation Abstracts International, Vol.54, No.(10)B., P.5396.
- 96-McNamare, Barry E.& McNamare, Francine, J.(2000): Keys to parenting a child with attention deficit disorder, New York: Barron's Educational series, Inc.P.9.
- 97- McNeil, C. (1995): " ADHD classroom kiti: An inclusive approach to behavior management." Children work/ child display, available online, <http://www.nichmy.Org/puls bibiog bib 11lyt.htm>, PP. 1-14.
- 98-Merrel, C.& Tymms, p.B., (2001): " Inattention hyperactivity and impulsiveness: Their impact an academic achievement and progress." British

**Journal of Educational psychology, Vol.71, PP.43-56.**

- 99- **Murray, Natalia(2001): ADHD Advanced class for parents searching for solutions, New York: Brunner mazel PP.190-198.**
- 100-**National Institutes of Health (NIH),(1998):" Diagnosis and treatment of attention deficit hyperactivity disorder, . " Consensus Development Conference, November 16-18.**
- 101-**Natinal Institute of Mental Health, (1999):"A 14-month randomized clinical trial of treatment strategies for attention deficit / hyperactivity disorder, the M.T.A. Cooperative Group," General psychiatry, Vol.56.P.1073.**
- 102-**National Institute of Mental Health (NIH) (2000) : "Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) Questions and Answers," National Women's Health , Information Center, Available online <http://www.4 woman gov/ faq / adhd. htm> PP.109.**
- 103-**National Institute of Mental Health(2001):" Attention deficit hyperactivity disorder your child and you," A workbook for parents, U.S.A., Available on-line, Http: //www. Value options. Com/member adhd final pdf, PP.1-20.**
- 104-**Paniagua, freddy training A.,& Morrison, Patricia, B.,& Black, Sandra, A.,(1990):" Management of hayperactive conduct disorder child through correspondence: A preliminary study," Journal of behavior therapy and experimental psychiatry, Vol.21, No.(1)PP.63-68.**
- 105- **Paniagua, J.G,& Black, E.A.,(1992): "Correspondence treating and observational Learning in the net of Hyperactivity children," A Preliminary study child and family behavior therapy, Vol. 14, No.(3), PP.1-9**

- 106-Peckham, Carol, Editor, (2001): "what is attention deficit hyperactivity disorder, " New York: Nidus Information services, Inc. Available online <http://www.Reuters health. Com/well connected/ doc30. htm1>.
- 107- Pelham, William E.,& Murphy, Debra A.,& Vannatta, Kathryn,& Milich, Richard, & et.al.,(1992): Methylphenidate and attribution in boys with attention deficit hyperactivity disorder," Journal of consulting and clinical psychology, Vol. 60, No.(2),PP.282-292.
- 108- Pelham, William E., Carlosn, caryn, L., sams, Susan E., & volcano, Gary, & et.al.,(1993):"Separate and combined effects of methylphenidate and behavior modification on boys with attention deficit hyperactivity disorder in the classroom, " Journal of consulting and clinical psychology, Vol.61, No.(3),PP.506-515.
- 109- Pelham, W.E.& Hoza,b. (1996): "Comprehensive treatment for ADHD: A proposal for intensive summer treatment Programs and out patient follow-up",In E.Hibbs & P. Jensen (Eds), Psychosocial treatment research of child and Adolescent disorder, New York: APA Press, PP.311-340
- 110- Pelham, w.E.,& wheeler,T, chronic, A.(1998):"Empirically supported psychosocial treatments for attention deficit hyperactivity disorder,"Journal of Clinical Child Psychology, Vol.27,PP.190-205.
- 111- Pelham, W.E., Fabiano G.(2001): "Behavior modification" Child Adolescents, psychiatry Clinic North America, Vol.9pp.671-688.
- 112- Perrin, J.M., Shayne, M.W, Bloom, S.R., (1993): Home and community car for chronically 111 children, New York: Oxford University Press, PP.120-126.

- 113-** Pianco, Rosa G. (1997): " A behavioral parent training and school consultation program for parents and teacher of kindergarten and elementary school students diagnosed with attention deficit hyperactivity disorder," Dissertation abstracts International, Vol.58, No.(04), B.2110.
- 114-** Pineda, D.A. Lopera, F, Henoa,g.e., palacio, J.D., Catellanos, F.X., (2001); "Confirmation of high prevalence of attention deficit disorder in a Colombian community," Rev-Neural., Vol.32, No.(3) PP.217-222.
- 115-** Poley, J.A.(1996): " Effects of classroom cognitive behavioral training with elementary school ADHD. Student: A pilot study," Dissertation Abstracts International, Vol.53,A No.(9)P.1772
- 116-**Prior, M., white, J. Merrigan, c., Adler, R., (1998): " Preschool behavior problems in a multi cultural Australian urban area," Journal of Pediatric of Children Health, Vol.34, No.(2). PP. 164-169.
- 117-** Professional Group for Attention and Related Disorders (PGARD),(1991): P.G.A.R.D. response to Department of Education notice of inquiry, Washington, DC.: PGARD Press, PP.20-25.
- 118-**Riggs, Lisa Lin (1998): " Attention deficit/hyperactivity disorder and medical settings: An Evaluation study (Attention deficit hyperactivity disorder, Hmo," Dissertation Abstracts International, Vol.59, No.(08)B, P.4482.
- 119-** Rossiter, Thomas R.& Lavaque, Theodore, J. (1995):" A comparison of EEG. Biofeedback and psychostimulants in treating attention deficit hyperactivity disorders", Journal of New therapy, Vol.1,pp.48-59.
- 120-** Schacher, Russell, Tannock, Rosemary, (1993):" Childhood hyperactivity and psychostimulants: A review of extended treatment studies," Journal of

- Child and Adolescent Psychopharmacology., Vol.3,  
No.(2), PP.81-97.**
- 121- Shoor, s.t., (1990): " Parental attitudes and interactions in delinquency," British Journal of psychology Vol.32,No.(6),PP.304-315.
- 122- Silver,A.A.(1992): The heterogeneity of ADHD and some implication for education" Resources in Education, Vol.27, No.10,P.71.
- 123- Smith, K.H., (1995):" Three studies on the prevalence of the adolescents with mild mental retardation," unpublished Doctoral Dissertation, university of Georgia.
- 124- Smith, Baradley H.,& Pelham, W. E., Gnagy, E.,& yudell, R., (1998): "Equivalent effects of stimulant treatment for attention deficit hyperactivity disorder during childhood and adolescence," Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, Vol.37, No.(3), PP.314-321.
- 125- Swanson, J.M., et.al., (1993): "Effect of stimulant medication of children with attention deficit disorder: A review of reviews, " Exceptional children, Vol.60, PP.154-162.
- 126- Tannock, R.,& Schachar, R.,(1992):"Methylphenidate and cognitive preservation in hyperactive children, " Journal of Child Psychology Psychiatry, Vol.33, No.(7), PP.1217-1228.
- 127- **The ADD. Center, (1999): On- Task, Get with the " Behavior" Program London: Harrogat, Available online, http: www. Add center. Co.uk / on- task- 899V.31-hlm1 p.1-5.**

- 128- Todd, Nelson Barbara M. (1997): "An assessment of a generalization across setting of a parenting strategies programs for ADHD children (Attention deficit hyperactivity disorder)" Dissertation Abstracts International, Vol.58-No.(10), B.P.5634.
- 129- Waschusich, Daniel A.& Kipp, Heidi,L., Pelham, W.E., (1998): " Generalization of behavioral and psychostimulant treatment of attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD),Discussion and examples," Behavior Research and Therapy, Vol. 36, No.(7-8), PP.675-694.
- 130- Weaver, John,(2000): "Attention deficit hyperactivity disorder," stress Management Mental Health clinics, Available online, <http://www. Stress management clinic. Com/articles. htm> p.1-5
- 131- Willcutt, E.G., Pennington, B.F, Chhabildes, N.A., Friedman, M.c., Alexander, J., (1999): " Psychiatric co- morbidity associated with DSM4 ADHD in a non referred sample of twins, " Journal of Academic Children- Adolescent Psychiatry, Vol.38, No.(11), PP.1355-1362.
- 132- Woltersdorf, M.A.(1992): Videotape self modeling in the treatment of attention deficit hyperactivity," Disorder child and Family Behavior therapy, Vol.14, No,(2) PP.134-147.
- 133- Wong. Bernice, Y.L., (1998) : Learning about learning disabilities, 2<sup>ed</sup> Edition, New York: Academic Press, PP. 75-92.

- 134- Zametkin, A.,& Mordahl, T.E.. Gross, M.. King, A.C.,  
Semple, w.E.& Rumsey, J.. & Hamburger, s.&  
Cohen, R. M.&(1990): " Cerebral glucose  
metabolism in adults with hyperactivity of  
childhood onset." New England, Journal of  
Medicine, Vol.323, No.(2),PP.1361-1366.
- 135- Zentall, S.S., (2000): Attention deficit hyperactivity  
disorder, Part 4, Available online, <http://www.Kid source com/NICHCY/ADD4.htm1>,PP.1-5.





